

Acc. No: 14530

ప్రయోగ దీపిక

భూగోళ శాస్త్రము

ప్రథమ భాగము

రచయిత

శ్రీ వి. యు. భాస్కరరావు, ఎమ్. ఏ.

లెక్చరర్, భూగోళ శాస్త్ర శాఖ,

డి. ఎన్. ఆర్. కళాశాల, భీమవరము

సంపాదకులు


కీ. శే. డాక్టర్ టి. రామారావు

రిటైర్డ్ ప్రెసిపాల్, కాకినాడ

శ్రీ ఎ. వి. కృష్ణారాజు, ఎమ్. ఎన్.సి.

భూగోళ శాస్త్ర శాఖాధ్యక్షుడు,

డి. ఎన్. ఆర్. కళాశాల, భీమవరము



తెలుగు అకాడమి

హైదరాబాద్

1971

B.A., & B.Sc. TEXTBOOK OF PRACTICAL GEOGRAPHY PART I:
Author : Sri V. U. Bhaskara Rao ; *Editors*: Late Dr. T. Rama Rao, &
Sri A.V. Krishnamraju; First edition, 1971; pp. viii + 100; Published by
TELUGU AKADEMI, Hyderabad-29 (A. P.

© TELUGU AKADEMI
Hyderabad

First Published, 1971

All rights whatsoever in this book are strictly reserved and no portion of it may be reproduced by any process for any purpose without the written permission of the copyright owners.

Published with the assistance of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare under the scheme for production of University level literature in Indian Languages.

Price Rs. 3.25

PRINTED IN INDIA

Text at SWAARAJYA PRINTING WORKS, 10, Padmanagar, Secunderabad-25.

Cover at Dolton Press, Hyderabad-1
Andhra Pradesh.

భూ మి క

భారతప్రభుత్వంవారి ఆర్థికసహాయంతోను, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వమూ రాష్ట్రంలోని విశ్వవిద్యాలయాలూ అందిచ్చిన సహాయసహకారంతోను, తెలుగు అకాడమి ఇంటర్మీడియట్ పాఠ్యగ్రంథాలను ప్రచురించి విద్యార్థుల, ఉపాధ్యాయుల ఆదరాభిమానాలు చూరగొన్నదని అందరికీ తెలుసు. అల్పవ్యవధానంలో, రాష్ట్రాన్ని ఆవరించిన సంక్షోభసమయంలో, మొట్టమొదటిసారిగా విశ్వవిద్యాలయస్థాయిలో తెలుగులో పాఠ్యగ్రంథ ప్రచురణ చేపట్టి సకాలంలో ఆ బృహత్కార్యాన్ని అకాడమి విజయవంతంగా నిర్వహించగలిగింది.

తెలుగుఅకాడమి పాఠ్యగ్రంథాలను ప్రచురించటంతో తనబాధ్యత తీరినట్లు భావించలేదు. రాష్ట్రంలోని విభిన్న పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయ పతినిధులను సమావేశపరిచి ఆయా గ్రంథాలను కూలంకషంగా విమర్శింపజేసింది. చర్చాఫలితాలను నిపుణుల, సంపాదకుల, రచయితల దృష్టికి తెచ్చినమీదట ఆయా గ్రంథాలను పరిష్కరించి పునర్ముద్రించినాము. ఈ కార్యభారాన్ని కూడా అకాడమి సకాలంలోనే నెరవేర్చగలిగింది.

1970 సెప్టెంబరునెల మధ్యలో హైదరాబాద్ లో జరిగిన సమావేశంలో రాష్ట్రంలోని మూడు విశ్వవిద్యాలయాల ఉపాధ్యక్షులూ - డి గ్రీస్థాయిలో కూడా విద్యాబోధన తెలుగులో జరుగుతుందికాబట్టి-విద్యార్థుల, ఉపాధ్యాయుల ఉపయోగార్థము డి గ్రీస్థాయి శాస్త్రగ్రంథప్రచురణ తెలుగు అకాడమి చేపట్టవలెనని తీర్మానించినారు. అంతేకాదు. 1971 సెప్టెంబరులోగా ఒక్కొక్క శాఖలో కనీసం ఒక్కొక్క గ్రంథాన్ని అయినా అకాడమి ప్రకటించవలెనని ఆదేశించినారు. అక్టోబరునెల ఉత్తరార్ధంలో మూడు విశ్వవిద్యాలయాలలో ఆయా శాఖలకు అధిపతులుగా ఉన్నవారు, పాస్ బోర్డు అధ్యక్షులు అకాడమిలో ఏర్పాటైన సమావేశంలో పాల్గొని మూడు విశ్వవిద్యాలయాల పాఠ్య ప్రణాళికలను సమన్వయించి సమగ్రపాఠ్యప్రణాళికను నిర్ణయించడంతోబాటు అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులు మున్నగువారిని ఆయా గ్రంథాలకు రచయితలుగా, సంపాదకులుగా ఎన్నిక చేసినారు. నవంబరు రెండో వారంనుంచి గ్రంథరచనతో సంబంధమున్నవారందరూ ప్రాథమికసమావేశాలు జరిపి ఆయా గ్రంథాల రచనా విధానాలను నిర్ణయించుకొన్నారు.

1971 మే నెలనుంచి వ్రాతప్రతులు అకాడమికి చేరడం ఆరంభమయింది. గ్రంథ రచనారంభానికి పూర్తిచేయటానికి మధ్యకాలంలో ఆరునెలలుమాత్రమే. ఈ అల్పవ్యవధిలో అకాడమి అనేక నూతనసమస్యలను ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది.

ప్రచురించవలసిన గ్రంథాలసంఖ్య (ఇంటర్మీడియట్ లోని) 60 నుంచి (డిగ్రీ స్థాయిలో) రమారమి నాలుగింతలు పెరిగింది. సమగ్రపాఠ్యప్రణాళికను అనుసరించి ఒక్కొక్క శాస్త్రంలోని భిన్న శాఖలలో ప్రతిదానిలోనూ కనీసం ఒక పుస్తకమైనా ప్రచురించవలసి రావటం ఇందుకు ప్రధానకారణము. శాస్త్రాలసంఖ్య (ఇంటర్మీడియట్ లోని) 13 నుంచి (డిగ్రీస్థాయిలో) 20 కి పెరిగింది. వీటిలో మొదటిసారిగా ప్రాథమిక జీవికావిద్యలలో ఒకటైన బి. కాం. చదువుకు కావలసిన గ్రంథాలనుగూడా ప్రచురింప వలసివచ్చింది. ఈ కార్యభార మెట్లా ఉన్నా, ఒక్కొక్క శాస్త్రంలో కనీసం రెండు గ్రంథాలనయినా సెప్టెంబరులోగా అందించటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. ఈ సందర్భంలో వచ్చిన బృహత్తరసమస్య సాంకేతిక పదసంచయనము.

అకాడమి సాంకేతికపదాల విషయంలో మూడు ప్రధాననియమాలను పాటించింది : (1) సంకేతాలు, సమీకరణాలు, రసాయన ద్రవ్యాలు, జంతువృక్షనామధేయాలు, మూలకాలు, మొదలైనవాటి విషయంలో అంతర్జాతీయ పారిభాషిక పదాలను ప్రతిలిఖించటం (transliteration); (2) ఇంతవరకూ వాడుకలోఉన్న తెలుగుపదాలు పనివస్తాయన్నవాటినే వాడటం; (3) భారతప్రభుత్వంవారు సంతరించిన శబ్దజాలము తెలుగుభాషాలక్షణాలకు సరిపడినట్లయితే స్వీకరించటం. ఈ సాంకేతికపదాలసంఖ్య లక్షలలో ఉండటంవల్ల మూలభాషలలో చాటికున్న అర్థవిశేషాలను, వ్యుత్పత్తులను, నిర్వచనాలను పరిక్షించి చర్చించి అధికసంఖ్యాకనిపుణులు అంగీకరించినవిధంలో పట్టికలు తయారుచేయటం బహుకష్టసాధ్యమే అయింది. భిన్నశాస్త్రాలలో భిన్నార్థాలలోగాని ఏకార్థంలోగాని ఉపయోగపడే సమానపారిభాషికపదాల విషయం లోపకవాక్యతను ఏకరూపతను సాధించటానికి చాలా శ్రమించక తప్పలేదు.

ఈ గ్రంథంలో ఉపయోగించిన పారిభాషికపదాల విషయంలో మరి రెండు మూడు విశేషాలను ప్రత్యేకించి చెప్పవలసిఉంది. పూర్వగ్రంథాల ద్వారాగాని అకాడమి పాఠ్యగ్రంథాల ద్వారాగాని వాడుకకెక్కిన తెలుగు పారిభాషికపదాలను పునరుపయోగంలోకి తెచ్చినాము. తెలుగు భాషాస్వభావానికి విరుద్ధంగాని జాతీయభాషాపదాలనుగూడా ఉపయోగించినాము. ఇందుకు ప్రధానకారణము ఏనాటికైనా తెలుగు మాటలతోనే శాస్త్రబోధన చేయవలసివస్తే అప్పటి అవసరాలకు సరిపడినంత మూలపద సంపదను ఇప్పుడే సంతరించవలెనన్న ఆశయంనూ ప్రమే. ఇటువంటి పదాల ప్రక్కన అంతర్జాతీయ పారిభాషికపదాలను ఆంగ్లలిపి లోకుండలికరించి ఇచ్చినాము. కాబట్టి పఠన పాఠనాలకు ఇబ్బంది కలగదని ఆశిస్తున్నాము. అంతర్జాతీయపారిభాషిక పదాలనే వాడి తెలుగు మాటలు వాడనప్పుడు ప్రతిలేఖనం (transliteration) చేసి కుండలికరణాలలో ఆంగ్లలిపిలో ఆయా పదాలను సమకూర్చినాము. తెలుగుమాటలను వాడినచోట్ల ప్రతిలేఖనం చేయలేదు. గ్రంథమధ్యంలోనూ గ్రంథాంతపట్టికలోనూ ఆంగ్లంలో ఇచ్చిన పదాలనుబట్టి ప్రతిలేఖనాలను పాఠకులు గ్రహించగలరన్న విశ్వాసమే అందుకుకారణము. కాబట్టి, ఈ సందికాలంలో, అంతటా అంతర్జాతీయపారిభాషికపదాలనే వాడదలచుకొన్నవారు తెలుగుమాటలకు బదులు ప్రతిలేఖనాలనే వాడుకోవచ్చు.

అయితే పెద్దఎత్తున స్వల్పవ్యవధిలో చేసిన ప్రతికార్యాన్ని పునర్విమర్శించి

నప్పుడుగాని పరిష్కరించటం సాధ్యపడదు. ఇంటర్మీడియట్ పుస్తకాల విషయంలోవలెనే డిగ్రీస్థాయి గ్రంథాల విషయంలోనూ త్వరలోనే చర్చలు జరుపుతాము. అనుభవ సంపాదనంవల్ల పునర్ముద్రణలో చాలా మెరుగులు పెట్టగలమని ఆశిస్తున్నాము.

శాస్త్రగ్రంథప్రచురణతోబాటు ఆంగ్లభాషలోని ప్రామాణికశాస్త్రీయగ్రంథాలను తెలుగులోకి అనువదించే కార్యభారంకూడా అకాడమి మీదనే ఉన్నది. భిన్న శాస్త్రాలకు చెందిన రమారమి 70 పుస్తకాలకు అనువాదాలనుకూడా ఇదే సమయంలో తలపెట్టినాము.

డిగ్రీస్థాయి గ్రంథాలను రచించటంలో కొద్దిపాటి మార్పులు చేసినాము. ఆయా గ్రంథాలను కొందరు రచింపగా మరికొందరు సంపాదకత్వంవహించి పరిశీలించారు. కొన్ని సమయాలలో విశ్వవిద్యాలయాచార్యులే (వీరిని పూర్వం నిపుణులని వ్యవహరించినాము) సంపాదకులుగా ఉంటారు. సాధారణంగా ఒక్కొక్క గ్రంథానికి ఒకే ఒక సంపాదకుడుంటాడు. రచయితలు మాత్రం సాధారణంగా ఒకరికి మించిఉంటారు. సాధారణంగా ఆయా శాస్త్రాలలో విశేషపరిశోధన చేసినవారే ఆయా గ్రంథాలకు సంపాదకులు, బోధనలో బాగా అనుభవం ఉన్నవారే రచయితలు. డిగ్రీస్థాయి పుస్తకాలవిషయం కాబట్టి ఆధునికవిజ్ఞానావసరాలను గుర్తించి ఈ ఏర్పాటు చేయవలసి వచ్చింది. ఈ స్థాయిలో ఒక శాస్త్రాన్ని కొందరు ప్రత్యేకవిషయంగాను మరికొందరు సాధారణ విషయంగాను చదువుతారు. వీలయినంతవరకూ ఆయా విద్యార్థుల అవసరాలకు అనుగుణంగానే ప్రత్యేక గ్రంథాలు ప్రచురిస్తున్నాము.

ప్రకృతగ్రంథరచనావిధానాన్ని, అందులోని విశిష్టతను, 'ప్రవేశిక' లో రచయితలూ సంపాదకులూ వివరించినారు. విద్యార్థుల, అధ్యాపకుల ఉపయోగార్థము ఇంగ్లీషు - తెలుగు పారిభాషికపదపట్టికను ప్రత్యేకించి గ్రంథాంతంలో ఇచ్చినాము. గ్రంథంలోకూడా తెలుగులో పారిభాషికపదాలను మొదట వాడినప్పుడు అంతర్జాతీయ పర్యాయపదాలను కుండలీకరణాలలో పేర్కొన్నాము. ఈ గ్రంథప్రచురణకు కేంద్ర రాష్ట్రప్రభుత్వాలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, అకాడమి పాలకవర్గము, ఉద్యోగులు, రచయితలు, సంపాదకులు, నిపుణులు, ముద్రాపకులు, బ్లాక్ మేకర్సు, మాకిచ్చిన సహాయ సహకారాలకు మేము కృతజ్ఞులము.

ప్రకృతగ్రంథప్రచురణలో మాకు తోడ్పడిన చిత్రకారుడు శ్రీ ఎ. పోమేశ్వర రావుకు, ముఖచిత్ర రచయిత శ్రీ ఎమ్. బలరామాచార్యకు మేము కృతజ్ఞులము.

ఈ గ్రంథము మా పూర్వప్రచురణ లన్నింటివలెనే అందరి ఆదరాభిమానాలు సంపాదించగలదని విశ్వసిస్తున్నాము. ప్రథమప్రయత్నంకాబట్టి ఏవైనా కొన్ని పొరపాట్లు వచ్చిఉంటాయి. పరిష్కృతపునర్ముద్రణలో ఆయా లోపాలను పరిహరించగలమని ఆశిస్తున్నాము.

ప్రవేశిక

భూగోళశాస్త్రంలో ప్రయోగదీపిక ప్రాముఖ్యాన్ని ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. భూగోళశాస్త్రానికి మనచిత్రాలు ప్రధాన సాధనాలు. వివిధ దేశాలను, ప్రజలను తాను స్వయంగా చూడలేకపోయినా, ఆ మానచిత్రాలద్వారా వాస్తవిక విషయాలు తెలుసుకోగలుగుతున్నాము. అంతేకాకుండా మానచిత్రాలూ, రేఖాచిత్రాలు లేకపోయినట్లయితే శాస్త్రజ్ఞుడు వాస్తవ విషయాలను స్పష్టంగాను, దృఢంగాను నివేదించడానికి అవకాశము ఉండదు. కాబట్టి మానచిత్ర పరిశీలనలో ప్రావీణ్యం గడించడం ఒక్కటే చాలదు; మానచిత్రాలు చూయించేయడానికి సామర్థ్యంకూడా సంపాదించవలె.

భూగోళ శాస్త్రంలో ప్రయోగాత్మక కృషి ప్రయోగశాలలో చేసే పని, తేత్రపరిశీలన రెండు కలిసి ఉంటాయి. తేత్ర పరిశీలనద్వారా సాంఖ్యిక వివరాలద్వారా సేకరించిన సమాచారాన్ని ప్రయోగశాలలో మానచిత్రాలుగాను, రేఖాచిత్రాలుగాను రూపొందిస్తారు.

భూగోళశాస్త్రంలో ప్రయోగాత్మక కృషికి సంబంధించిన మౌలికసూత్రాలను అందించడమే ఈ పుస్తకంయొక్క ప్రధాన లక్ష్యము. ఇది బి. ఏ; బి. ఎస్. సి. చదివే విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని వ్రాసినది. ఈ పుస్తకంలో స్కేల్లు, వాటి వివర్ధనము, లఘూకరణము, నిమోన్నత స్వరూపాలను సూచించడం, సమోన్నతరేఖల అంతర్వేశనము, పార్శ్వరేఖాకృతి రేఖనము, మానచిత్రప్రక్షేపాలు, బ్లాక్ చిత్రాలు మొదలైనవాటిని గురించి తెలిపే ప్రయత్నం జరిగింది.

విషయ సూచిక

1. మానచిత్ర స్కేల్ : లేఖన పద్ధతి	...	1— 7
2. తులనాత్మక స్కేల్	...	8— 9
3. వికర్ణ స్కేల్	...	10—12
4. మానచిత్రాలపై దూరాలను, వైశాల్యాలను కొలవడం	...	13—17
5. మానచిత్రాలలో ఉపయోగించే గ్రిడ్, నిర్దేశాంశపద్ధతి	...	18—22
6. మానచిత్రాల వివర్ధనము, లఘూకరణము	...	23—27
7. మానచిత్రాలలో ఉన్నత, నిమోన్నత రూపురేఖల నిరూపణ		28—36
8. సమోన్నతరేఖల అంత ర్వేశనము	...	37—39
9. పార్శ్వరేఖాకృతి లేఖనము	...	40—45
10. అంతర దృగ్గోచరత, మరుగుభూమి తెలుసుకోవడం	...	46—47
11. మానచిత్ర ప్రతేపాలు	...	48—87
12. బ్లాక్ చిత్రాలు	...	88—93
అనుబంధము 1	...	94
అనుబంధము 2	...	95
పారిభాషిక పదకోశము : ఇంగ్లీషు-తెలుగు, తెలుగు-ఇంగ్లీషు		97—100

మానచిత్రస్కేల్ : లేఖనపద్ధతి

(MAP SCALE : METHOD OF DRAWING)

స్కేల్ అంటే మానచిత్రం లోని దూరాలకు భూమిపై అది చూపే దూరాలకు మధ్యగల నిష్పత్తి. ఏ మానచిత్రానికైనా స్కేల్ జీవమువంటిది. స్కేల్ ను మూడు విధాలుగా సూచించవచ్చు.

1. ఒక వాక్యరూపంలో (Simple statement),

ఉదాహరణ : 1 అంగుళానికి 4 మైళ్ళు; 1 సెం.మీ. కు 4 కి.మీ.లు.

2. ఉపలక్షక భిన్నరూపంలో (Representative fraction),

ఉదాహరణ : ఉపలక్షక భిన్నము (ఉ.భి.) 1 : 2, 53, 440 లేదా

$\frac{1}{2,53,440}$.






3. గ్రాఫిక్ స్కేల్ గా గీసి చూపడం (Graphic scale)

ఉదాహరణ : 1వ పటం చూడండి.

సాధారణంగా ప్రతి మానచిత్రం లోనూ పైమూడింటిలో ఒక్కటి గాని, మొత్తం మూడుగాని, ఇస్తారు. సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వారి స్థలాకృతి మానచిత్రాలలో (Topographical maps) స్కేల్ ఈ మూడు విధాలుగా సూచిస్తారు.

గ్రాఫిక్ స్కేల్ లోని ప్రాథమికాంశాల (Primary divisions) నన్నింటినీ ద్వితీయాంశాలు (Secondary divisions) గా విభజిస్తే దానిని 'పూర్తి విభజిత స్కేల్' (Fully-divided scale) అనీ, అట్లాకాక మొదటి ప్రాథమికాంశాన్ని మాత్రమే ద్వితీయాంశాలుగా విభజిస్తే దానిని 'వివృత విభజిత స్కేల్' (Open divided scale) అనీ అంటారు. ఈ రెండు రకాల స్కేల్ లు 1వ పటము a, b, లలో చూపడం జరిగింది. ఇవేకాక తులనాత్మక స్కేల్ (Comparative scale), పూరిత రేఖాస్కేల్ (Filled-line scale), హ్రస్వరేఖా స్కేల్ లు (Short-line scale) కూడ 1వ పటం లోని c, d, e లలో చూచించినాము.

మానచిత్రంలో గ్రాఫిక్ స్కేల్ గీసి ఉంటే, ఆ మాన చిత్రాన్ని పెద్దదిగా గాని, చిన్నదిగాగ ని చేసినప్పుడు గ్రాఫిక్ స్కేల్ కూడా అదేపరిమాణంలో పెద్దదిగా లేదా చిన్నదిగా మారుతుంది. కాబట్టి స్కేల్ లను వేరే లెక్కకట్ట నవసరంలేదు.



పటము-1: వివిధ రకాల స్కేల్ లు

స్కేల్ సూచించే విధాలలో

ఒక దానినుంచి మరొకదానికి మార్చడం

ఉపలక్షకభిన్నరూపం నుంచి వాక్యరూపానికి మార్చడం

1వ లెక్క : ఒక స్కేల్ యొక్క ఉ. భి. 1 : 1,26,720 అయితే ఆ స్కేల్ ను అంగుళానికి మైళ్ళు చూపే వాక్యరూపానికి మార్చండి.

మానచిత్రంలోని దూరము

$$\begin{aligned} \text{ఉ. భి.} &= \frac{\text{ఆ మానచిత్రం చూపే భూమిమీది దూరము}}{\text{మానచిత్రంలోని 1 అంగుళము}} \\ &= \frac{\text{భూమిమీది 1,26,720 అంగుళాలు}}{\text{భూమిమీది 1,26,720 అంగుళాలు}} \end{aligned}$$

మనకు అంగుళానికి మైళ్ళు చూపే స్కేల్ కావాలి.

మానచిత్రంలోని 1 అంగుళము

భూమిమీది 1,26,720 అంగుళాలు

$$\therefore 1 \text{ అంగుళము} = \frac{1,26,720}{63,360} \text{ మైళ్ళు } (\because 1 \text{ మైలు} = 63,360 \text{ అంగుళాలు})$$

= 1 అంగుళము 2 మైళ్ళు చూపుతుంది.

∴ వాక్యరూపంలోని స్కేల్ 1 అంగుళానికి 2 మైళ్ళు.

2వ లెక్క : ఒక మానచిత్రం యొక్క ఉ.భి. 1/6,00,000 అయితే దానిని సెం.మీ.కు కి. మీ.లు చూపే వాక్యరూపానికి మార్చండి.

ఉ. భి. 1 : 6,00,000

∴ 1 సెం. మీ. = 6,00,000 సెం. మీ.లు

= 6 కి. మీ.లు (∵ 1 కి. మీ. = 1,00,000 సెం. మీ.లు)

3వ లెక్క : ఒక మానచిత్రం యొక్క ఉ. భి. 1 : 15,840 అయితే దానిని 1 అంగుళానికి ఫర్లాంగ్లు చూపే వాక్యరూపానికి మార్చండి.

ఉ. భి. 1 : 15,840.

∴ 1 అంగుళము = 15,840 అంగుళాలు.

$$= \frac{15,840}{7,920} \text{ ఫర్లాంగ్లు } (\because 1 \text{ ఫర్లాంగ్} = 7,920 \text{ అంగుళాలు})$$

= 2 ఫర్లాంగ్లు

∴ వాక్యరూపంలోని స్కేల్ 1 అంగుళానికి 2 ఫర్లాంగ్లు.

వాక్యరూపంలోని స్కేల్ను ఉపలక్షక భిన్నరూపానికి మార్చడం

4వ లెక్క : ఒక మానచిత్రం యొక్క స్కేల్ 1 అంగుళానికి 4 మైళ్ళు అయితే దానిని ఉ. భి. రూపానికి మార్చండి.

స్కేల్ 1 అంగుళానికి 4 మైళ్ళు.

ఉ.భి.లో మానచిత్రంలోని దూరాలు, భూభాగంమీది దూరాలు, ఒకే మాపన ఏకాంకాల (Measuring units) లో ఉంటాయి కాబట్టి మైళ్ళను కూడా అంగుళాలలోకి మార్చవలె.

1 అంగుళము = $4 \times 63, 360$ అంగుళాలు (∵ 1 మైలు = 63,360 అం.)

= 2,53,440 అంగుళాలు

ఇప్పుడు ఉ.భి. 1 : 2,53,440 లేదా 1/2,53,440.

ఉ.భి.లో అంగుళాలుగాని మరి ఏ ఇతర మాపన ప్రమాణాలుగాని గుర్తించరాదు. ఉపలక్షక భిన్నము మానచిత్రంలోని దూరాలకు, భూమి మీది అవే దూరాలకు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని చూపే ఒక నిష్పత్తి కాబట్టి ఏ మాపన ఏకాంకాలు గుర్తించరాదని గమనించవలె.

5వ లెక్క : ఒక మానచిత్రం యొక్క స్కేల్ 2 అంగుళాలకు 1 మైలు అయితే ఆ స్కేల్ను ఉ.భి. రూపంలోకి మార్చండి.

స్కేల్ 2 అంగుళాలకు 1 మైలు.

లేదా 2 అంగుళాలు = 63,360 అంగుళాలు.

$$\therefore 1 \text{ అం.} = \frac{63,360 \text{ అం.}}{2}$$

$$= 31,680 \text{ అం.}$$

$$\therefore \text{ఉ.భి.} = 1 : 31,680 \text{ లేదా } 1/31,680.$$

6వ లెక్క : ఒక మానచిత్రంయొక్క స్కెల్ 1 సెం.మీ. కు 2 కి.మీ.లు. అయితే ఆ స్కెల్ ను ఉ.భి. రూపంలో చెప్పండి.

$$\text{స్కెల్ } 1 \text{ సెం.మీ. కు } 2 \text{ కి. మీ. లు.}$$

$$1 \text{ సెం.మీ.} = 2,00,000 \text{ సెం.మీ.లు.}$$

$$\therefore \text{ఉ.భి.} 1 : 2,00,000. \text{ లేదా } 1/2,00,000$$

7వ లెక్క : ఒక మానచిత్రంయొక్క స్కెల్ 1 అంగుళానికి 1 మైలు అయితే ఆ స్కెల్ ను సెం.మీ. కు కి.మీ. లు చూపే వాక్యరూపానికి మార్చండి.

$$\text{స్కెల్ } 1 \text{ అంగుళానికి } 1 \text{ మైలు.}$$

$$1 \text{ అం.} = 63,360 \text{ అం. లు.}$$

$$\therefore \text{ఉ.భి.} 1 : 63,360 \text{ లేదా } 1/63,360$$

ఇప్పుడు సెం.మీ. కు కి.మీ. లు చూపే వాక్యరూపానికి మార్చవలె.

$$1 \text{ సెం.మీ.} = 63,360 \text{ సెం.మీ. లు.}$$

$$\begin{aligned} & \frac{63,360}{1,00,000} \text{ కి.మీ.లు} \\ & = 0.6336 \text{ కి.మీ. లు} \end{aligned}$$

$$10 \text{ సెం.మీ.లు} = 6.336 \text{ కి.మీ.లు}$$

$$\therefore \text{వాక్యరూపంలోని స్కెల్ } 10 \text{ సెం.మీ. కు } 6.34 \text{ కి. మీ. లు.}$$

స్కెల్ వాక్యరూపంలోగాని, ఉపలక్షక భిన్నరూపంలోగాని

ఇచ్చినప్పుడు గ్రాఫిక్ స్కెల్ గీసేవిధము.

1వ లెక్క : ఒక మానచిత్రంయొక్క స్కెల్ 1 : 1,00,000 అయితే అంగుళానికి మైళ్ళు చూపే గ్రాఫిక్ స్కెల్ గీయండి.

$$\text{ఉ.భి.} 1 : 1,00,000$$

మనము అంగుళానికి మైళ్ళు చూపే గ్రాఫిక్ స్కెల్ గీయవలె కాబట్టి ఉపలక్షక భిన్నంలోని లవము 1 అంగుళం అనుకొంటే హారము 1,00,000 అంగుళాలు అవుతుంది.


$$\therefore 1 \text{ అం.} = 1,00,000 \text{ అం. లు.}$$

ఘామి మీద 1,00,000 అం. లు మానచిత్రంలోని 1 అం. చే సూచిస్తే,

ఘామి మీద 63,360 అం. లు (1 మైలు) మానచిత్రంలో ఎన్ని అం. లో సూచించవలె ?

$$= \frac{1}{1,00,000} \times 63,360 = 0.634 \text{ అం. లు.}$$

మనకు రికార్డులోని కాగితానికి సరిపడేటట్టుగా గ్రాఫిక్ స్కెల్ పొడవు 8 మైళ్ళు సూచించేటట్టుగా గీయండి.



ఒక మైలు 0.634 అం. లచే సూచిస్తే, 8 మైళ్ళు $0.634 \times 8 = 5.072$ అంగుళాలలో సూచిస్తారు.

8 మైళ్ళు 5.072 అం. లు కాబట్టి మొదటి దశాంశస్థానానికి సరిచేయండి. అట్లా చేస్తే 5.1 అం. వస్తుంది. 5.1 అం. ల పొడవుగల AB అను సరళరేఖను గీయండి. దానిని 8 సమభాగాలు చేయండి. AB రేఖను 8 సమభాగాలు చేయడానికి కింది పద్ధతిని అవలంబించండి.

A వద్ద కిందికి సుమారు 25° లేదా 30° ల మధ్య కోణంచేసే AC రేఖను గీయండి. AC రేఖను విభాగిని సహాయంతో అనువైన కొలతతో 8 సమభాగాలు చేసి, వాటిని a, b, c, d, e, f, g, h అని గుర్తించండి. 2వ పటంలో చూపినట్లుగా hB అను కలపవలె. hB రేఖకు g, f, e, d, c, b, a ల గుండా AB రేఖను ఖండించేట్లుగా సమాంతరరేఖలు గీయవలె. ఈ రేఖలు AB రేఖను 8 సమభాగాలుగా విభజిస్తాయి. ఈ భాగాలు ఒక్కొక్కటి ఒక మైలును సూచిస్తాయి. వీటినే 'ప్రాథమికాంశాలు' అంటారు.

గ్రాఫిక్ స్కేల్ పై ప్రాథమికాంశాలను గుర్తించేటప్పుడు 2వ పటంలో చూపినట్లుగా, మొదటి ప్రాథమికాంశాన్ని విడిచి '0' తో ప్రారంభించి, 1, 2, 3, 4 మొదలగు మైళ్ళుగా గుర్తించవలె.

ఒక మైలును సూచించే మొదటి ప్రాథమికాంశాన్ని మళ్ళీ 8 సమభాగాలు చేస్తే, ఒక్కొక్కభాగము 1 ఫర్లాంగ్ ను సూచిస్తుంది. ఈ భాగాలనే 'ద్వితీయాంశాలు' అంటారు. ద్వితీయాంశాలుగా విభజించడానికి ప్రాథమికాంశము చిన్నదిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కింది పద్ధతిని అవలంబించవలె.

మొదటి ప్రాథమికాంశానికి రెండు పక్కల ఒకటి పైకి, మరొకటి కిందికి 2వ పటంలో చూపినట్లుగా రెండు లంబరేఖలను గీయవలె. మైలుకు ఫర్లాంగ్ ల 8 కాబట్టి, మనకు 8 ద్వితీయాంశాలు కావలె. ఆ లంబరేఖల మీద 8 సమభాగాలు చేయవలె. వాటిని 2వ పటంలో చూపిన విధంగా కలుపుతూ రేఖలను గీస్తే, అవి మొదటి ప్రాథమికాంశాన్ని 8 సమ భాగాలుగా ఖండిస్తాయి. మొదటి ప్రాథమికాంశం మీద '0' విభాగించుంచి ఎడమవైపుకు 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ఫర్లాంగ్ ల విభాగాలు గుర్తించవలె. ఇప్పుడు మనకు కావలసిన గ్రాఫిక్ స్కేల్ పూర్తి అయింది. (2వ పటము)

అభ్యాసము

ఒక మానచిత్రపు స్కేల్ 2 అంగుళాలకు 1 మైలు అయితే మైళ్ళు, గజాలు చూపే గ్రాఫిక్ స్కేల్ గీయండి.

ఒక మానచిత్రపు స్కేల్ $1/2,00,000$ అయితే కి. మీ. లు, $1/2$ కి. మీ. $1/4$ కి. మీ. చూపే గ్రాఫిక్ స్కేల్ గీయండి.

ఒక మానచిత్రపు స్కేల్ 6 అంగుళాలకు 1 మైలు అయితే ఫర్లాంగ్ లు, చైన్ లు (Chains) చూపే గ్రాఫిక్ స్కేల్ గీయండి,

ఒక మానచిత్రపు ఉ. భి. $1/6,00,000$ అయితే కి. మీ. లు చూపే గ్రాఫిక్ స్కేల్ గీయండి.

100 లింకులకు 1 అంగుళం చూపే తేత్రపు గ్రాఫిక్ స్కేల్ గీయండి.

ఒక మానచిత్రంలో 8 చ. అం. లు 512 చ. గజాల స్థలాన్ని సూచిస్తాయి. దానికి సమానమైన గజాల గ్రాఫిక్ స్కేల్ గీయండి.

తులనాత్మక స్కేల్

(COMPARATIVE SCALE)

తులనాత్మక స్కేల్ అంటే రెండుగాని, అంతకంటే ఎక్కువగాని, వేరు వేరు మాపనవ్యవస్థల (Systems of measurement) ఏకాంకాలలో దూరాన్ని కొలిచి, పోల్చి చూడటానికి వీలుగా, సాధారణమైన గ్రాఫిక్ స్కేల్ లను ఒకేచోట వాటి '0' విభాగాలు ఏకీభవింపజేసి (Coincide) గీయడం. ఈ రకం స్కేల్ లు మొదటి ప్రపంచయుద్ధకాలంలో, ఒక దేశపు యుద్ధసైనికులు వేరేదేశంలో పనిచేసేటప్పుడు వారికి అర్థం కావడం కోసం తయారయి ప్రసిద్ధికెక్కినాయి.

ఈ స్కేల్ గీసేవిధమంతా, మామూలు గ్రాఫిక్ స్కేల్ వలెనే ఉంటుంది. ఆ విధము ఇంతకుముందే చెప్పినాము. కాని ఆ రెండుస్కేల్ ల '0' విభాగాలు ఏకీభవించేటట్లు చేయవలె.

1వ లెక్క : ఒక మానచిత్రపు స్కేల్ 1 సెం. మీ. కు 1 కి. మీ. అయితే కి. మీ. లు, మైళ్ళు చూపే తులనాత్మకస్కేల్ గీయండి.

ముందుగా స్కేల్ ను ఉ.భి. రూపంలోకి మార్చండి.

స్కేల్ 1 సెం. మీ. కు 1. మీ. లేదా 1 సెం. మీ. = 1,00,000 సెం. మీ. లు.

∴ ఉ. భి. 1/1,00,000

మొదట మైళ్ళు చూపే గ్రాఫిక్ స్కేల్ గీయండి.

∴ 1 అం. = 1,00,000 అం.

1,00,000 అం. లు 1 అం. చేత సూచింపబడితే,

63,360 అం. లు $1/1,00,000 \times 63,360 = 0.634$ అం. లచే సూచిస్తారు.

స్కేల్ పొడవు అనువుగా ఉండటానికి 10 మైళ్ళు తీసుకొందాము.

10 మైళ్ళు 6.34 అం. ల చే సూచించవలె.

6.34 అం. ల రేఖను గీసి, దానిని 10 సమభాగాలు చేయండి. ఒక్కొక్క

ప్రాథమికాంశము ఒకమైలును సూచిస్తుంది. మళ్ళీ మొదటి ప్రాథమికాంశాన్ని 4 ద్వితీయాంశాలుగా విభజించండి. ఒక్కొక్క ద్వితీయాంశము 1/4 వ వంతు మైలును సూచిస్తుంది.


ఇప్పుడు దానికింద కి.మీ.లు చూపే గ్రాఫిక్ స్కేల్ గీయండి.

ఉ. భి. 1: 1,00,000 అయితే 1 సెం.మీ. = 1,00,000 సెం.మీ.లు.

1 సెం.మీ. = 1 కి.మీ.

15 కి.మీ.లు = 15 సెం.మీ.లు.

15 కి.మీ.లు రికార్డు పరిమాణానికి అనువుగా ఉండడానికి తీసుకొన్నాము.



పటము-8.

15 సెం.మీ. పొడవు రేఖను గీయండి. దానిని 15 ప్రాథమికాంశాలుగా విభజించండి. మళ్ళీ మొదటి ప్రాథమికాంశాన్ని 10 సమభాగాలు చేయండి. ఒక్కొక్క భాగము 100మీటర్లను సూచిస్తుంది. కాని ఈ సెం.మీ.కు కి.మీ.ల స్కేల్ గీసేటప్పుడు, దీని '0' విభాగము 2వ పటంలో మాదిరి మైళ్ళ స్కేల్ '0' విభాగానికి ఏకీకరించి గీయవలె.

అభ్యాసము

1 వ లెక్క : ఒక జపాన్ మానచిత్రస్కేల్ 1 సున్ (Tsun) = 1 లి (Li) అయితే, 'లి' లు, కి.మీ.లు చూపే తులనాత్మకస్కేల్ గీయండి.

1 సున్ = 3 సెం.మీ.లు.

జపాన్ స్కేల్

10 ఫన్లు = 1 సున్

10 సున్లు = 1 ఛి

10 ఛిలు = 1 ఛార్

180 ఛార్లు = 1 లి

2 వ లెక్క : ఒక రష్యా మానచిత్ర ఉ.ఖి. 1/125,000 అయితే వెర్స్ట్ (Verst) లు, మైళ్ళు చూపే స్కేల్ గీయండి.

500 శాంజ్యన్లు (Sanyans) = 1 వెర్స్ట్, 1.5086 వెర్స్ట్ = మైలు.


వికర్ణస్కేల్

(DIAGONAL SCALE)

మనము ఇంతవరకు గ్రాఫిక్ స్కేల్ లో ప్రాథమికాంశాలను, ద్వితీయాంశాలను మాత్రమే విభజన చేసినాము. ఉదాహరణకు ఒక గ్రాఫిక్ స్కేల్ లో మైళ్ళు, ఫర్లాంగ్ లు, ప్రాథమిక, ద్వితీయాంశాలుగా చేసినాము. కాని మనకు ఫర్లాంగ్ లలో ఇంకాచిన్న విభాగము అంటే గజాలను చూపే వికర్ణాంశాలు (Diagonal divisions) కూడా అవసరమైనప్పుడు గీసే స్కేల్ వికర్ణ స్కేల్. అట్లాగే అంగుళాన్ని కూడా శతాంశం వరకు విభజన చేయవచ్చు.

సాధారణంగా ద్వితీయాంశాన్ని కావలసినన్ని వికర్ణాంశాలుగా విభజించడానికి, ద్వితీయాంశం చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. కాబట్టి ద్వితీయాంశంపై వికర్ణాంశాలను గుర్తించడం వీలుకాదు. వికర్ణాంశాలు విభజించడానికి కింది పద్ధతిని అవలంబిస్తాము.

1 అంగుళపు పొడవుగల AB రేఖను 10 భాగాలు చేయవలెననుకోండి. AB రేఖను గీసి దానిపై ABCD చదరాన్ని నిర్మించండి. AC ని 10 సమభాగాలు చేసి, వాటిగుండా AB కి సమాంతరరేఖలు BD రేఖవరకు గీయండి. BD రేఖపై 1 నుంచి 10 వరకు భాగాలు B నుంచి D వరకు గుర్తించండి. ABCD చదరానికి CB కర్ణం గీయండి. CB ని సమాంతరరేఖలు ఖండించే బిందువులవద్ద B నుంచి C వరకు a, b, c, d, e, f, g, h, i లుగా గుర్తించండి. ఈ బిందువుల నుంచి AB కి లంబరేఖలు గీసే AB పది సమభాగాలుగా విభక్తమవుతుంది. ఇప్పుడు a1, AB లోని $1/10$ వ భాగానికి సమానము. అట్లే b2; c3; d4; e5; f6; g7; h8; i9; C10; లు వరుసగా AB లోని $2/10$; $3/10$; $4/10$; $5/10$; $6/10$; $7/10$; $8/10$; $9/10$ వ భాగాలకు సమానము.




ఫటము-4: వికర్ణ స్కేల్

4 వ పటంలో CB కర్ణం గీయడంవల్ల సమాంతర రేఖలను ఖండించి కావలసిన భాగాలు విభక్తమయినాయి. దీనిని వికర్ణ స్కేల్ అంటారు. ఇట్లాగే ద్వితీయాంశము ఎంతచిన్నదైనా, ఒక చతుర్భుజాన్ని గీసుకొని, దానికి కర్ణము, సమాంతర రేఖలు 4 వ పటంలో, గీసినట్లు గీసి కావలసిన భాగాలు చేయవచ్చు.

1వ లెక్క : ఒక అంగుళంలోని శతాంశం వరకు కొలవడానికి వీలుపడే వికర్ణ స్కేల్ గీయండి.

6 అం.ల AB అనే రేఖను గీసి, 6 సమభాగాలు చేయండి. ఒక్కొక్క ప్రాథమికాంశము 1 అం. సూచిస్తుంది. మొదటి ప్రాథమికాంశాన్ని మళ్ళీ 10 ద్వితీయాంశాలుగా విభజించండి. ఒక్కొక్కటి $1/10$ అం. లేదా 0.1 అం. సూచిస్తాయి. ఇంతవరకు చేయడం మనము ఇదివరకే తెలుసుకొన్నాము. 0.1 అం. ద్వితీయాంశాన్ని మళ్ళీ 0.01 అం. లేదా $1/100$ అం. భాగాన్ని చూపే వికర్ణాంశాలుగా విభజించవలె. దానిని కింది పద్ధతి ప్రకారం చేయండి.



పటము - 5.

5 వ పటంలో చూపినట్లుగా మొదటి ప్రాథమికాంశంలోని A వద్ద 'O' విభాగం వద్ద అనువైన పొడవుతో రెండు లంబరేఖలను పైకి గీయండి. ఈ రెండు లంబరేఖలపై 10 సమభాగాలు గుర్తించి, AB రేఖకు సమాంతర రేఖలను ఈ భాగాలకు కలుపుతూ గీయండి. ఇప్పుడు మొదటి ద్వితీయాంశాన్ని ('O' నుంచి 0.1 విభాగంవరకు) పది వికర్ణాంశాలు చేయడం తెలుసుకొందాము.

'O' నుంచి 0.1 అం. వరకుగల ద్వితీయాంశానికి రెండు పక్కల లంబరేఖలు పదవసమాంతరరేఖ వరకు పైకి గీయండి. ఇప్పుడు xyz దీర్ఘ చతుర్భుజము ఏర్పడింది. ox కర్ణం గీయండి. ఈ కర్ణము 4 వ పటంలో చూపిన మాదిరిగానే సమాంతర రేఖలను ఖండించి 0.1 అం. ద్వితీయాంశాన్ని పది వికర్ణాంశాలుగా విభజిస్తుంది. ఈ వికర్ణాంశము ఒక్కొక్కటి 0.01 అం. సూచిస్తుంది. ఇట్లాగే మిగిలిన ద్వితీయాంశాలను కూడా, 5 వ పటంలో చూపిన మాదిరిగా నిర్మించనవసరం లేకుండానే కర్ణాలు గీయవచ్చు. ox కలిపినట్లుగానే 1,2 భాగాలను, 2,3; 3,4... మొదలైన పది ద్వితీయాంశాలను కలుపుతూ కర్ణాలు గీస్తే వికర్ణాంశాలు చేయడం పూర్తి అవుతుంది.

ఇప్పుడు కొలవడానికి అనువుగా ఉండడానికి సమాంతరరేఖలు AB రేఖకు సమానంగా పొడిగించండి.

మనకు స్కేల్ లో 1.68 అం. కావాలంటే గుర్తించవచ్చు.

5 వ పటంలో $xy = 1.68$ అం. (1 అం. ప్రాథమికాంశాలలోను. 0.6 అం. ద్వితీయాంశాలలోను, 0.08 అం. వికర్ణాంశాలలో కర్ణం మీదుగా పైకి కొలవవలె.

అభ్యాసము

2వ లెక్క : ఒక మానచిత్ర ఉ.భి. $1/50$ అయితే, గజాలు, అడుగులు, అంగుళాలు కొలవడానికి వికర్ణ స్కేల్ గీయండి.

3వ లెక్క : ఉ.భి. $1/10,000$ అయితే మీటర్లు, డె.మీ, సెం.మీ.లు కొలవడానికి వికర్ణ స్కేల్ గీయండి.

మానచిత్రాలపై దూరాలను, వైశాల్యాలను కొలవడం

(MEASURING DISTANCES AND AREAS ON MAPS)

మానచిత్రంలోని ఏ రెండు బిందువుల మధ్య దూరాన్నినా కనుక్కోవలసివచ్చినప్పుడు, ఆ రెండు బిందువులను కలుపుతూ ఒక సరళరేఖను గీసి దాని నిడివిని విభాగినితో గాని స్కేల్ తోగాని కొలిచి ఆ మానచిత్రస్కేల్ ప్రకారం దూరాన్ని లెక్క కట్టవచ్చు. లేదా ఆ సరళరేఖను కొలిచిన విభాగినినిగాని స్కేల్ నుగాని ఆ మానచిత్రం లోని గ్రాఫిక్-స్కేల్ మీద ఉంచి, ఆ రెండు బిందువుల మధ్య ఉన్న దూరము సరాసరి భూమిపై చూపిన మాపక ఏకాంకాలతో కొలవవచ్చు.

కాని ఒక్కొక్కప్పుడు సరళంగా ఉండక వంపులుతిరిగిన రోడ్లు, రైలు మార్గాలు, నదుల పొడవులు కొలవవలసి వస్తుంది. అప్పుడు కింది పద్ధతులతో ఆ దూరాలను కొలవవచ్చు.


1. దారము సహాయంతో ఆ వక్రరేఖను కొలవడం.
2. విభాగినితో ముక్కలుముక్కలుగా ఆ వక్రరేఖను కొలవడం.
3. గుండ్రటి నాణేన్ని ఉపయోగించి కొలవడం.
4. పటమాపకము (Opisometer) ఉపయోగించి కొలవడం.

మనము కొలవవలసిన రేఖ ఎంత వక్రంగా ఉన్నా ఒక దారం తీసుకొని, దానిని ఆ వక్రరేఖ వెంట ఉంచుతూ, కొలవ వలసిన ఆ వక్రరేఖ పొడవును ఆ దారపు పొడవును బట్టి కనుక్కోవచ్చు.

కొలవవలసిన రేఖ అంత ఎక్కువ వంపులతో ఉండకపోతే సరళంగా ఉన్న వక్రరేఖలోని భాగాలను ముక్కలు ముక్కలుగా విభాగినితో కొలిచి, వాటి మొత్తం పొడవు తెలుసుకొంటే ఆ రేఖ భూమిపై ఎంత పొడవుందో తెలుసుకోవచ్చు. అట్లే ఒక గుండ్రటి నాణేన్ని మనము ఎన్నిసార్లు ఆ వక్రరేఖపై దొర్లించినామో తెలుసుకొంటే ఆ వక్రరేఖ దూరాన్ని లెక్కకట్టవచ్చు.

పైన చెప్పిన విధానాలలో దూరాలను కొలిచేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త వహించవలె. వక్రరేఖను రెండు సార్లు ఆ చివర నుంచి ఒకసారి, ఈ చివర నుంచి మరొకసారి కొలిచి, ఆ రెంటిని సరాసరి లెక్కిస్తే, కొంతవరకు తప్పు సరిఅవుతుంది.

పటమాపకము అనే పరికరాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా కూడా దూరాలను కొలవవచ్చు. పటమాపకానికి (6 వ పటంలో చూపిన విధంగా) ఒక చిన్న



పటము-6.

పశ్చాత్తరము ఉంటుంది. ఈ చిన్న పశ్చాత్తరాన్ని ఆ వక్రరేఖమీద దొర్లించినప్పుడు, ఆ చక్రం తిరిగిన చుట్టను ఆధారంగా చేసుకొని పటమాపకంలోని డయల్ (Dial) మీద దాని విలవ మైళ్ళు, కి.మీ. లలో ఒక ముల్లు చూపుతుంది.


మానచిత్రంలో మనము కొలిచే ప్రాంతము కొండ ప్రాంతమైతే కొండ వాలుగా ఉండడంచేత, మనము కొలిచిన దూరము అసలు దూరం కన్న తక్కువ ఉంటుంది. మనము ఆ దూరము సరిగా కొలవవలెనంటే, కొలవవలసిన సరళ రేఖ యొక్కగాని, వక్రరేఖ యొక్కగాని పార్శ్వ రేఖాచిత్రాన్ని (Profile) స్కేల్ అతిశయం లేకుండా గీసి, ఆ వక్రరేఖను కొలిచి మానచిత్రస్కేల్ ప్రకారం అసలుదూరాన్ని నిర్ణయించవచ్చు.

పటంలోని క్రమరహిత ఆకృతి.



భాగాల (Irregular forms) వైశాల్యాలు కనుక్కోవడం.

క్రమరహిత ఆకృతి భాగాల వైశాల్యం కింది పద్ధతులద్వారా కనుక్కోవచ్చు:

1. **గళ్ళను ఉపయోగించే పద్ధతి (Method of squares):** క్రమరహిత ఆకృతిపై గళ్ళున్న ఉల్లిపొరకాగితాన్ని (Tracing paper) ఉంచి, ఆ భాగం లోపలి గళ్ళను లెక్కించి, ఆ గళ్ళ పరిమాణాన్ని, పటంయొక్క స్కేల్ ను అనుసరించి వైశాల్యాన్ని లెక్క కట్టవచ్చు. గళ్ళున్న ఉల్లిపొర కాగితం లేనిచో పటాన్ని మొదట ఉల్లిపొర కాగితం మీదగీసి, దానిని గ్రాఫ్ పేపర్ పై లెక్కపెట్టి గళ్ళు లెక్కించి వైశాల్యాన్ని కట్టవచ్చు. ఈ రెండు పద్ధతులే గాక మానచిత్రాలపై గళ్ళను సరాసరి గీసి వాటిని లెక్కించి వైశాల్యాన్ని లెక్క కట్టవచ్చు. ముందుగా పూర్తిగళ్ళు ఎన్ని ఉన్నవో లెక్కించవలె. 7వ పటం 'a' లో పూర్తిగళ్ళు 620 ఉన్నాయి. తరువాత సగంగాని అంత కన్న ఎక్కువగా ఉన్న గళ్ళనుగాని లెక్కించి రెంటిచే భాగిస్తే పూర్తిగళ్ళు వస్తాయి. సగం కన్న తక్కువగా ఉన్న గళ్ళను $1/4$ వంతుగళ్ళగా లెక్కించి, బాగా చిన్నవాటిని వదలి వేయవచ్చు. పటంలో పూర్తి గళ్ళు 620 + సగముగళ్ళు 38 + నాలుగవవంతు




విస్తీర్ణము = 6.455 చ.మైళ్లు



అంతర్లంబరేఖలు

విస్తీర్ణము = 6.9 చ.మైళ్లు



స్కేల్ 1:63,360

విస్తీర్ణము = 6.22 చ.మైళ్లు

గళ్ళు $26 =$ మొత్తం గళ్ళు $620 + 19 + 6 \frac{1}{2} = 645 \frac{1}{2} = 6.455$ చ.అం.
స్కేల్. 1 అం = 1 మైలు.

వైశాల్యము = 6.455 చ.మైళ్ళు

2. అంతర్లంబ రేఖల పద్ధతి : (Method of offsets)

క్రమరహితాకృతి భాగాన్ని వీలై నన్ని క్రమబద్ధ ఆకారాలుగా విభజించి, మిగిలిన భాగాలపై అంతర్లంబ రేఖలను (Offsets) గీయడంవల్ల కూడా వైశాల్యాన్ని లెక్క కట్టవచ్చు, పటంలోని క్రమరహితాకృతి భాగము 5 త్రిభుజాలు గాను, ఒక దీర్ఘచతురస్రంగాను విభజించబడింది. చుట్టూ సరిహద్దు దగ్గర మిగిలిన భాగాన్ని 7వ పటం 'b' లో చూపిన విధంగా అంతర్లంబ రేఖలు గీసి వైశాల్యం లెక్క కట్టవలె.

త్రిభుజాకారపు వైశాల్యము = $\frac{1}{2}$ భూమి \times ఎత్తు.

5 త్రిభుజాల మొత్తం వైశాల్యము = $0.2 + 0.375 + 0.48 + 0.255 + 0.15 = 1.41$ చ.అం. దీర్ఘ. చతురస్రపు వైశాల్యము = పొడవు \times వెడల్పు.

$$2.6 \text{ అం} \times 1.560 = 3.9 \text{ చ.అం.}$$

మిగిలిన భాగపు (లంబరేఖలు గీయడంద్వారా) వైశాల్యాన్ని లెక్క కట్టడానికి సూత్రము :

$$\text{వైశాల్యము} = \frac{L (0 + 0_1 + \dots + 0_n)}{n}$$

L = అంతర్లంబ రేఖలు గీసిన రేఖయొక్క పొడవు;

$0 + 0_1 + \dots + 0_n$ = అంతర్లంబ రేఖల మొత్తం పొడవు;

n = అంతర్లంబ రేఖల సంఖ్య.

3. పట్టీ పద్ధతి (Strip method): వైశాల్యము లెక్క కట్టవలసిన భాగంపై గాని, దానిపై ఉంచిన ఉల్లిపొర కాగితంపై గాని, సమాన దూరంలో (స్కేల్ కు అనుకూలంగా ఉండేటట్లు) సమాంతర రేఖలు గీసి, ఆభాగపు సరిహద్దు రేఖవద్ద రెండువైపుల లంబరేఖలను గీయండి. ఈ లంబరేఖలు గీసేటప్పుడు ఒక విషయం గుర్తించుకోవలె. ఈ లంబరేఖకు రెండువైపుల సమానమైన వైశాల్యము ఉండేటట్లు గీయవలె. అప్పుడు మనము వదలివేసిన విస్తీర్ణము, కలుపుకొన్న విస్తీర్ణానికి ఇంచుమించుగా సరిపోతుంది.

పటంలో వైశాల్యము కట్టవలసిన భాగంపై 0.2 అం. మధ్యదూరం ఉండే టట్లు సమాంతర రేఖలు గీయబడినాయి. ఈ సమాంతర రేఖలకు రెండువైపుల లంబరేఖలను, సరిహద్దుకు ఒక ప్రక్క కొంతభాగాన్ని కలుపుకొంటే మరొక ప్రక్క దానికి సమానమైన భాగాన్ని వదలి వేసేటట్లుగా గీసి దీర్ఘచతురస్రాలుగా విభజించబడినాయి. వాటిని 'పట్టీలు' అంటారు.

ఈ పట్టీల వైశాల్యము = మొత్తం పట్టీల పొడవు \times 0.2 అం. (వెడల్పు)

అభ్యాసము

గీడె నా ఒక సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వారి స్థలాకృతి మానచిత్రాన్ని తీసుకోండి. దానిలో ఒక చెరువు ఉన్న ప్రాంతాన్ని గాని, ఒక సమోన్నత రేఖకు

మరొక సమోన్నత రేఖకు మధ్యప్రాంతాన్ని గాని, రక్షితారణ్య (Reserve forest) ప్రాంతాలు గాని తీసుకొని, మానచిత్రంలోని ఆ భాగపు వైశాల్యము గళ్ళ పద్ధతిలోను, అంతర్లంబరేఖల పద్ధతిలోను, పట్టిల పద్ధతిలోను గణించి వాటిని పోల్చిచూడండి.

మానచిత్రాలలో ఉపయోగించే గ్రిడ్,

నిర్దేశాంక పద్ధతి


(USING OF GRID AND COORDINATE SYSTEM IN MAPS)

ముందుగానే నిర్ణయించుకొన్న రేఖలను ఆధారంగా చేసుకొని, భూమి ఉపరితలంమీది బిందువుల ఉనికిని తెలియజేసే పద్ధతినే నా నిర్దేశాంక పద్ధతి అని పిలువవచ్చు. భూతలం మీది ప్రదేశాల ఉనికిని తెలియజేసే పద్ధతులలో అక్షాంశ, రేఖాంశాల పద్ధతి మనకు తెలిసిందే. అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలు మనము ఊహించుకొని భూమిపై గీసు కొన్న రేఖలు. ఇట్లానిలువుగా, అడ్డంగా గీసుకొన్న రేఖలు గళ్ళుగా ఏర్పడుతాయి. ఆ గళ్ళను ఆధారంగా చేసుకొని మనము ఏదైనా ప్రదేశం యొక్కగాని, భూస్వరూపం యొక్కగాని ఉనికిని చెప్పవచ్చు.


భూగోళ శాస్త్రజ్ఞులు ఒక ప్రదేశం యొక్క అక్షాంశ రేఖాంశాలను భౌగోళిక నిర్దేశాంకాలు (Geographical Coordinates) గానూ గ్లోబ్మీది అక్షాంశ రేఖాంశాల అల్లికను భౌగోళికపు గళ్ళుగానూ పరిగణిస్తారు. సామాన్యంగా పెద్దస్కేల్ మానచిత్రాలు చదరాలుగా ఉంటాయి. వాటికి కుడి, ఎడమ వైపుల రేఖాంశాలు, పైన కింద అక్షాంశాలు పరిధులుగా ఉంటాయి. ఈ అక్షాంశ రేఖాంశాలమధ్య కొన్ని నిమిషాలుగాని, కొన్నిడిగ్రీలుగాని దూరము ఉంటుంది. ఈ పరిధులుగా గల అక్షాంశ రేఖాంశాలు ఇంకా చిన్న భాగాలుగా విభజించడం వల్ల ఆ ప్రాంతము చిన్నచిన్న గళ్ళుగా ఏర్పడుతుంది. ఒక్కొక్కసారి చిన్న భాగాలు పూర్తి రేఖలుగా కాక సూక్ష్మ చిహ్నాలుగాను, అక్షాంశ రేఖాంశాలు ఖండించు కొన్నచోట్ల చిన్న 'X' చిహ్నాలు, గాను గుర్తిస్తారు.

ఈ భౌగోళిక నిర్దేశాంకాలనే గోళిక నిర్దేశాంకాలు (Spherical coordinates) అనికూడ అనవచ్చు. ఇవి గోళాకారపు ఉపరితలంమీది బిందువుల ఉనికిని తెలియజేస్తాయి. ఈ భౌగోళిక నిర్దేశాంకాలను నిలువుగా గీస్తే నిర్దేశాంకాల మధ్యదూరము క్రమంగా భూమధ్య రేఖనుంచి ధ్రువాలవైపు పోతున్నప్పుడు తగ్గుతూ, ధ్రువాలవద్ద ఒకే బిందువుతో కలిసిపోతుంది. గోళిక నిర్దేశాంకాలు సరళరేఖలుగా ఉండవు, సమదూరంలో ఉండవు. అవి తక్కిన ఇతర ప్రక్షేపాలలోని గళ్ళకు కూడా సరిపడవు. కాబట్టి దీనికిభిన్నమైన పద్ధతిని కనుక్కోవలసిన అవసరముంది. ఆ కొత్త పద్ధతే సమతల నిర్దేశాంక పద్ధతి (Plane coordinate system).

మిలిటరీ గ్రీడ్ తోని నిర్దేశాంకాలు సరళ రేఖలుగా ఉండి, ఒక్కొక్క చదరము 1,000 మీటర్లు లేదా 1,000 గజాలు వెడల్పుగడిగా ఏర్పడుతుంది. ఈ




గ్రిడ్ లో మీటర్ ప్రాథమికమైన మాపకసకాంకము. పూర్వము మీలిటరీ గ్రిడ్ ను గజాలలోనే చూపించేవారు. మెట్రిక్ పద్ధతిలో 10, 100, 1,000 చొప్పున కొలత పెరుగుతుంది కాబట్టి లెక్క సులభము. కాని మన సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వారి స్థలాకృతిక మానచిత్రాలలో స్కేల్ లను బ్రిటిష్ కొలమానాన్ని ఉపయోగించినారు. ఈమధ్య మెట్రిక్ పద్ధతిలోకి స్కేల్ లను మారుస్తున్నారు. ఉదాహరణ :



పటము - 8 (B).

పటము A, B, C లను చూడండి. $1/4''$; $1/2''$; $1''$ స్కేల్ ల స్థలాకృతిక చిత్రాలలో గ్రిడ్ మాత్రమే ఇచ్చినారు.

నిలువుగా ఉన్న గ్రిడ్ రేఖల విలువ తూర్పువైపు, అంటే మానచిత్రానికి కుడివైపు పెరుగుతుంది. అడ్డంగా ఉన్న గ్రిడ్ రేఖల విలువ ఉత్తరానికి, అంటే మానచిత్రం వైభాగంవైపు పెరుగుతుంది. గ్రిడ్-రేఖలలో, నలువైపుల చివర ఉన్న రేఖలపై మాత్రం వేలు, పదివేలు విలువను తెలియజేసే సంఖ్యలను మాత్రం గుర్తిస్తారు. అంటే వేల స్థానానికి తరవాత ఉన్న మూడు స్థానాలను



పక్షము - 8 (C).

BHA

Print

పదివేల స్థానానికి ముందున్న స్థానాలను ఆచ్ఛువేయక వదలివేస్తారు. కాని పూర్తి సంఖ్యలలో విలువలు, రెండు నిర్దేశాంకాలకు, మానచిత్రంలో నైర్మతి మూలకు ఇస్తారు. మానచిత్ర అంతర్భాగంలో కూడా కొన్ని గ్రిడ్ రేఖలపై అక్కడక్కడ రెండు సంఖ్యలలో విలువలు ఇస్తారు. వేలకన్న చిన్నభాగాలైతే 100 చొప్పున, ఇంకాచిన్న భాగాలైతే 10 చొప్పున కొలవడానికి మానచిత్రంలో ఈశాన్య మూలకు గ్రిడ్ స్కేల్ ఇస్తారు. దీనిసహాయంతో చిన్నచిన్న భాగాల వరకు కూడా గ్రిడ్ నిర్దేశకం (Reference) చెప్పవచ్చు. పటాలు చూడండి. 1,000 మీటర్లు గాని, గజాలుగాని చూపే ఉపభాగాలు పూర్తి రేఖలుగా కాక, గ్రిడ్ రేఖలపై అన్నిచోట్ల సూక్ష్మంగా గుర్తిస్తారు. 100 మీటర్లు లేదా గజాలు మధ్యాంతరంతో గ్రిడ్ రేఖలు పెద్ద (1 : 1,000,000 అంతకన్న పెద్దవి) స్కేల్ మానచిత్రాలలో ఉపయోగిస్తారు. 10,000 మధ్యాంతరమున్న గ్రిడ్ రేఖలు చిన్న స్కేల్ మాన

చిత్రాలలో (1 : 1,000,000 స్కేల్ కంటే చిన్నవిగా) ఉపయోగిస్తారు. పటంమీది గ్రిడ్ రేఖల సంఖ్య, వాటి మధ్యాంతరము, పటంయొక్క స్కేల్ నుబట్టి మారుతుంది. ఉదాహరణ : 1 అం. నికి 10 మైళ్లనుంచి 4 మైళ్ళ స్కేల్ వరకు ఉన్న మాన చిత్రాలలో గ్రిడ్ రేఖల మధ్యాంతరము 10,000 గజాలు. 1 అం. నుంచి 6 అం. స్కేల్ మానచిత్రాలలో 1,000 గజాలు, అంతకన్న పెద్దస్కేల్ పటాలలో 100 గజాలు ఉంటుంది.

గ్రిడ్ నిర్దేశాంకాలు ఉపయోగించి, మానచిత్రంలో ఏదైనా ఒక ప్రదేశంయొక్కగాని, బిందువుయొక్కగాని ఉనికి చెప్పడం

మానచిత్రంలోని ఏదైనా ఒక బిందువుయొక్క గాని, స్థలంయొక్క గాని ఉనికి చెప్పేటప్పుడు కిందివిషయాలు దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి.

1. గ్రిడ్ నిర్దేశాంకాలను లెక్కించేటప్పుడు ఎప్పుడూ ముందుగా 'X' నిర్దేశాంకాలపై కుడివైపు లెక్కించి, ఆవిలువను ముందుచెప్పి, తరవాత 'Y' నిర్దేశాంకాలను పైకి లెక్కించి చెప్పవాలి. 'X' నిర్దేశాంకాలను కుడివైపు లెక్కపెట్టిన వాటిని ఈస్టింగ్స్ (Eastings) అనీ, 'Y' - నిర్దేశాంకాలను పైకి లెక్కించిన వాటిని నార్థింగ్స్ (Northings) అనీ అంటారు. కాబట్టి ముందుగా ఈస్టింగ్స్ ను, తరవాత నార్థింగ్స్ ను, ఉనికిని సూచించేటప్పుడు చెప్పవాలి.

2. మానచిత్రము అంచులమీద ఉండే గ్రిడ్ రేఖల విలువలను పూర్తిగా చెప్పనవసరంలేదు. పెద్దవిగా ముద్రించిన అంకెలను మాత్రమే చెప్పవాలి. మిగిలిన అంకెలను విడచిపెట్టవాలి.

ఉదాహరణ : 1270000 అని ఉన్నప్పుడు 70 అని మాత్రం వ్రాసి మిగిలిన అంకెలను వదిలివేయవాలి.

8 (C) వ పటంలోని 'X' అను బిందువు ఉనికి చెప్పండి.

ముందుగా ఈస్టింగ్స్ (Eastings) విలువ 015

తరవాత నార్థింగ్స్ (Northings) విలువ 665

తరవాత 'X' ఉన్న పెద్దగడిలో ఏ అక్షరాలున్నవి కూడా చూడవాలి.

LP అనే అక్షరాలు ఉన్నాయి.

కాబట్టి 'X' ఉనికి LP 015665 అవుతుంది.

అట్లే 8 (A) (B) పటాలలోని 'X' గుర్తుల ఉనికి కూడా చెప్పండి.

అభ్యాసము

ఏదైనా ఒక స్థలాకృతి మానచిత్రాన్ని తీసుకొని, దానిలో ఏదైనా ఒక స్థలము లేదా పట్టణపు ఉనికిని గ్రిడ్ సహాయంతో సూచించండి. అట్లే పరిసర గ్రామాలు, పట్టణాలు, నదీస్థలు, కొండ శిఖరాలు మొదలయిన వాటి ఉనికిని కూడా 2 - అంకెలు; 4 అంకెలు; 6 అంకెలు; 8 అంకెలు. వరకు, గ్రిడ్ నిర్దేశాంకాలలో చెప్పండి.

మానచిత్రాల వివర్ధనము, లఘూకరణము (ENLARGEMENT AND REDUCTION OF MAPS)

ఒకే మానచిత్రాన్ని వివర్ధనము (Enlargement) లేదా లఘూకరణం (Reduction) చేయవలసిన అవసరము మనకు అప్పుడప్పుడు వస్తుంది. అందువల్ల మానచిత్రంయొక్క స్కేల్ కూడా దానికి తగినట్లుగా మార్చవలసి వస్తుంది. మనకు కావలసిన స్కేల్ లో మానచిత్రం లేనప్పుడు, ఉన్న పటం యొక్క స్కేల్ ను మనకు కావలసిన స్కేల్ కు పెద్దదిగానో చిన్నదిగానో చేయవలసి వస్తుంది. ఉదాహరణకు మనకు 1:63,360 స్కేల్ లో మాత్రమే పటము ఉంది అనుకోండి. కాని మనము స్థలవినియోగము విపులంగా చూపవలసిన స్కేల్, మనకు ఉన్న స్కేల్ - పటంలో స్థలం కనిపించదు. కాబట్టి ఆ మానచిత్రంయొక్క స్కేల్ ఇంకా చిన్నదిగా, అంటే మానచిత్రంయొక్క పై శాల్యాన్ని ఇంకా పెద్దదిగా చేయవలె. వేరువేరు స్కేల్ లపై ఉన్న ఒకే ప్రాంత భాగాలను, ఒకే స్కేల్ లో ఉన్న ఏక మానచిత్రంగా కలపవలసినప్పుడు కూడా మనకు మానచిత్రాలను వివర్ధనము లేదా లఘూకరణం చేయవలసిన అవసరము ఏర్పడుతుంది.

మానచిత్రాలను కొన్ని పరికరాలను ఉపయోగించి వివర్ధనము లఘూకరణము చేయవచ్చు. గ్రాఫిక్ పద్ధతుల ద్వారాగానీ ఫోటోగ్రాఫిక్ (Photographic) పద్ధతితోగానీ చేయవచ్చు. వీటిలో రెండవ పద్ధతి ద్వారా మానచిత్రాలను వివర్ధనము లఘూకరణము చేయడానికి, ఆ పరికరాలు అందరికీ అందుబాటులో ఉండవు కాబట్టి, మొదటిపద్ధతితో సులువుగా చేయవచ్చు. అందువల్ల గ్రాఫిక్ పద్ధతి మాత్రమే ఇక్కడ వివరించడమైనది.

గ్రాఫిక్ పద్ధతుల ద్వారా మానచిత్రాల వివర్ధనము, లఘూకరణము

చదరపు గళ్ళ పద్ధతి (Method of Squares)

మానచిత్రం మీదగానీ, ఉల్లిపొర కాగితం మీదగానీ చతురస్రాకారపు గళ్లు గీసుకొని, ఒక గ్రిడ్ ను తయారుచేసి, ఆ మానచిత్రాన్ని కావలసిన రీతిగా పెద్దదిగా గాని, చిన్నదిగాగానీ మార్పు చేయవచ్చు. వీలుగా ఉంటే దీర్ఘచతురస్రాకారపు గళ్లను కూడా గీసుకొని చేయవచ్చు.

చతురస్రాకారపు గళ్లను మానచిత్రంమీద గీసి 1.5 సెం.మీ. = 120 కి.మీ. స్కేల్ పై ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ మానచిత్రాన్ని రెట్టింపు స్కేల్ కు వివర్ధనంచేయడం, సగము స్కేల్ కు లఘూకరణం చేయడం ఇవ పటంలో చూపినారు. ముందుగా

మానచిత్రంపై గీయడానికి వీలులేకపోతే, వాటిని వేరే ఉల్లిపొర కాగితం మీద గీసుకొని, పటంపై ఉంచవచ్చు. ఈ మూలమానచిత్రానికి పైన రెట్టింపు చేసిన పటం గీసి ఉంది. రెట్టింపు వివర్ధనంచేయడానికి, చతురస్రాకారపుగళ్ళ మధ్యాంతరం కూడా రెట్టింపు చేయవలె. అంటే వాటి మధ్యాంతరము 0.5 అం.లు ఉండేటట్లు అదేసంఖ్యలో చతురస్రాకారపు గళ్ళు గీసుకోవలె. ఈ గళ్ళు మాన చిత్రాన్ని ఖండించే బిందువులను ఆధారంగాచేసుకొని, ప్రతిగడిలోని మానచిత్ర వివరాలను, జాగ్రత్తగా పెద్దవిగా గీసిన గళ్ళలోకి, గడివారీగా బదిలీచేయవలె.

అట్లే మూలమానచిత్రాన్ని సగానికి లఘూకరించడం పక్క మాన చిత్రంలో చూపినారు. దీనిలో చతురస్రాకారపు గళ్ళ మధ్యాంతరము సగానికి, అంటే 0.125 అం. లకు తగ్గించి మళ్ళీ అదే సంఖ్యలో గళ్ళు గీసుకొని, గళ్ళవారీగా పటంలోని వివరాలను ఆగళ్ళలోకి జాగ్రత్తగా బదిలీ చేయవలె.

మానచిత్రంయొక్క స్కేల్లో మార్పు కావలిస్తే చతురస్రాకారపు గళ్ళ భుజాలు పెద్దవిగాగానీ, చిన్నవిగాగానీ చేయవచ్చు. చతురస్రాకారపు గడియొక్క భుజము పొడవును రెట్టింపు చేసినప్పుడు దాని వైశాల్యము నాలుగు రెట్లు పెరుగుతుంది. ఆ పొడవును సగానికి తగ్గించినప్పుడు, దాని వైశాల్యము నాల్గవవంతుకు తగ్గుతుంది.


మానచిత్రాలను, వివర్ధనమూ లఘూకరణమూ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త వహించవలె. లఘూకరించేటప్పుడు మూలమానచిత్రంలోని సమోన్నత రేఖలు, వాటి మధ్యాంతరం మొదలైన వివరాలను కొన్నింటిని మానచిత్రము బాగా కిక్కిరిసినట్లుంటే వదిలివేయవచ్చు. కాని వివర్ధనంచేసే టప్పుడు ఆ వివరాలను స్థలము ఉందికదా అని వివర్ధనంచేయడం తగదు. అట్లే రోడ్లు, రైల్వేలు, చెట్లు, మొదలైన సాంప్రదాయిక చిహ్నాలను (Conventional signs) కూడా మరీ పెద్దవిగా చేయకూడదు. మూలమానచిత్రంలోని చతురస్రాకారపు గళ్ళమధ్యాంతరము ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత నిర్దుష్టంగా పటంలోని వివరాలుకూడా వస్తాయి.

సరూప త్రిభుజాల పద్ధతి

(Method of similar triangles)

వివర్ధనంగానీ లఘూకరణంగానీ చేయవలసిన మానచిత్ర భాగము ఒక రోడ్డుకో, రైలుమార్గనికో, నదీలోయగా చూపే సన్నని భూభాగానికో చెందింది అయితే, ఈ సరూప త్రిభుజాల పద్ధతి ఉపయోగించవలె.

ఈ పద్ధతిద్వారా 1:63,360 స్కేల్ పై ఉన్న వార్ధానది కొంత భాగాన్ని, దానికి రెండువైపుల ఉన్న విషయ వివరాలనూ రెట్టింపు స్కేల్ కు (అంటే 1:126,720) వివర్ధనం చేయడం, సగము స్కేలుకు (1:31,680) లఘూకరించడం 10వ పటంలో చూపినారు. ముందుగా 1:63,360 స్కేల్ పై ఉన్న మూల మానచిత్రంలో చూపిన నదికి ఒక చివరనుంచి మరో చివరకు, నది వంపులను అనుసరించి, అవసరమైనన్ని మార్గదర్శక రేఖలు గీసుకోవలె. నది వెడల్పు ఎక్కువగాఉంటే రెండుగానీ అంతకన్న ఎక్కువగానీ వరుసలలో మార్గదర్శక



పటము-10: సమాప్త త్రిభుజాలను ఉపయోగించి వివర్ధనం, అఘాతరణం చేయడం

రేఖలకు సమాంతరంగా ఉండేటట్లు గీసుకోవలె. ఇప్పుడు ఆ మార్గదర్శక రేఖల రెండు చివరలను వీలై నంత దూరంలో ఉన్న 'O' అనే బిందువుకు కలుపవలె. అట్లే 'O' కు మానచిత్రభాగంలోని మిగిలిన ముఖ్యమైన బిందువులను కూడా కలుపుతూ సరళ రేఖలు గీయవలె. మానచిత్రాన్ని వివర్ధనం చేయడానికి మార్గదర్శక రేఖల చివరలగుండా పోయేటట్లు 'O' నుంచి గీసిన రేఖలను పొడిగించవలె. మూలమానచిత్రాన్ని రెట్టింపు వివర్ధనం చేయడానికి 'O' బిందువునుంచి మూల పటానికి ఉన్న దూరానికి రెండురెట్లు దూరంలో మూలపటంలోని మార్గదర్శక రేఖలకు సమాంతరరేఖలు గీయవలె. వీటిని ఆధారంగా చేసుకొని మానచిత్రంలోని వార్ధానది, దానికి రెండువైపుల చూపిన వివరాలను జాగ్రత్తగా గీయవలె.

అట్లే మూలమానచిత్రాన్ని సగానికి లఘూకరించడానికి, దానినుంచి 'O' బిందువుకు ఉన్నదూరానికి సగం దూరంలో మూలమానచిత్రంయొక్క మార్గదర్శక రేఖలకు సమాంతరరేఖలు గీయవలె. అవి ఆధారంగా మానచిత్రాన్ని లఘూకరించవచ్చు.

మార్గదర్శక రేఖల చివరలనుంచి 'O' బిందువుకు ఎంత ఎక్కువ దూరం ఉంటే మానచిత్రంలోని వివరాలు అంత సరిఅయిన నిష్పత్తిలో గీయవచ్చు.

అభ్యాసము

1. ప్రయోగశాలలో మీకిచ్చిన మానచిత్రాన్ని రెట్టింపు వివర్ధనం చేయండి.
2. ప్రయోగశాలలో మీకిచ్చిన మానచిత్రాన్ని గత్యపద్ధతిలోనూ సరూప త్రిభుజాల పద్ధతిలోనూ సగానికి లఘూకరణం చేయండి.

మానచిత్రాలలో ఉన్నత, నిమోన్నత రూపురేఖల నిరూపణ

(REPRESENTATION OF ELEVATION AND
RELIEF FORMS IN MAPS)


ఒక ప్రదేశపు ఉన్నతి (Elevation) అంటే ఆ ప్రదేశంలోని ఒక నిర్ణీత ఆధారతలాని (Datum plane)కి పైనఉన్న ఎత్తు. సముద్రమట్టము ఆధారతలంగా ఉంటుంది. భారతదేశంలోని ఆధారతలము మద్రాసులోని పర్వవేలా తరంగ సమయ మప్పటి సముద్రమట్టము (Mean sea level of the spring tide). ఎత్తు అనగానే అది ఎట్లాంటినిర్ణీత ఆధారతలానికి సంబంధము ఉండదు. ఉన్నతి అన్నప్పుడు ఆధారతలానికి తక్కువగా (Negative elevation) కూడా ఉంటుంది.

నైసర్గికస్వరూపము అంటే నిమోన్నతాలతో కూడిన భూపటల స్వరూపము. ఈ స్వరూప చిత్రణలో కొండలు, పీఠభూములు, భృగువులు (Cliffs) రిడ్జ్లు (Ridge), స్పర్లు (Spur), లోయలు మొదలైన స్వరూపాలను చిత్రించవలసి ఉంటుంది. వీటిని చిత్రించడంలో, మిగిలిన మానచిత్రవివరణలవలె కాక, మూడవ పరిమాణాన్ని కూడా చూపవలసి ఉంటుంది. అంటే పొడవు, వెడల్పులే కాకుండా ఎత్తును కూడా చూపవలె.


మానచిత్రాలలోని ఉన్నతిని స్థలోన్నతులు, Δ ఎత్తులు, (Tri. heights), బెంచ్ గుర్తులు (Bench marks), సాపేక్ష ఉన్నతులు (Relative heights) మొదలగువాటిద్వారా చూపవచ్చు.

నై సర్గికస్వరూపాన్ని మానచిత్రంలో చూపే పద్ధతులు ఆ చిత్రంయొక్క స్కేల్ను బట్టి మారుతూఉంటాయి. చిన్న స్కేల్ మానచిత్రాలలో నై సర్గిక స్వరూపాల ఉనికి, విస్తీర్ణము, సూక్ష్మంగా వాటి ఉన్నతిని మాత్రమే చూపవీలు అవుతుంది. పెద్ద స్కేల్ మానచిత్రాలలో, ఇవే కాకుండా వాటి స్వభాన, లక్షణాలను (ఎత్తు, వాలు మొదలయినవి) కూడా సరిగా చిత్రించవచ్చు.

నై సర్గికస్వరూపాన్ని హెషూర్లు (Hachures), హిల్ షేడింగ్ (Hill shading) ఉచ్చతాదర్శివర్ణము (Hypsometric colouring), సమోన్నతరేఖలు, ఆకారరేఖలు మొదలయినవాటిద్వారా చిత్రించవచ్చు. వీటిలో సమోన్నతరేఖల ద్వారా నిమోన్నతాలను చిత్రించడం బాగా ప్రసిద్ధమయింది. కనక సమోన్నత రేఖలతోనిమోన్నతాలను చిత్రించే పద్ధతిని ఇక్కడ తెలుసుకొందాము.




పటము-11 (A)




మొట్టమొదట నీ మోన్నత రూపురేఖల నిరూపణ

మొట్టమొదట నీ మోన్నత రూపురేఖల నిరూపణ


మొట్టమొదట నీ మోన్నత రూపురేఖల నిరూపణ




పటము-11 (D)




పటము-11 (E)




పటము -11 (F)



పటము-11 (G)



పటము-11 (H)




పటము-11 (I)

సమోన్నత రేఖల స్వభావాన్ని పూర్తిగా అర్థంచేసుకొంటే, ఒక ప్రాంతపు నిమోన్నత స్వరూపాల వర్ణనను బట్టి వాటి స్వరూపాలను సమోన్నత రేఖలలో గీయవచ్చు. ఇచ్చిన భూభాగపు వర్ణనను బట్టి ఆ ప్రాంతపు సమోన్నత రేఖా మానచిత్రాన్ని గీయడం తెలుసుకొందాము.

కింద వర్ణించిన భూభాగపు నిమోన్నత స్వరూపాన్ని బట్టి ఆ ప్రాంతపు సమోన్నత రేఖామానచిత్రాన్ని ఒక స్కేల్ ఎన్నిక చేసుకొని గీయండి.

ఒక దీవి 20 మైళ్ల పొడవు, 14 మైళ్ల వెడల్పుతో ఉత్తర దక్షిణాలకు వ్యాపించి ఉంది. ఆ దీవిలో సుమారు 5 మైళ్ళ వెడల్పుతో 800 అ.లు అత్యధిక-ఉన్నతిగల కొండల వరసలు ఉన్నాయి. అవి పడమటినుంచి తూర్పుదిశకు క్రమంగా వారి ఉన్నాయి. ఆ కొండలు ఉత్తరాన ఉన్న పీఠభూమి మీదుగా తూర్పునుంచి పశ్చిమానికి గోర్జ్ లో ప్రవహించే ఒక నది కారణంగా వేరుఅవుతున్నాయి. పీఠభూమి



ఉత్తరాన ఒక నిట్రమైన ఎస్కార్ప్మెంట్ (Steep Escarpment) ద్వారా తీర మైదానం (Coastal plain) తో కలుస్తుంది. ఉత్తర తీర మైదానము పశ్చిమాన వెడల్పుగా ఉండి, తూర్పుదిశకు వెళ్ళే కొద్దీ సన్నమవుతుంది. పీఠభూమి అంచు తూర్పున ఒక భృగువుతో అంతమై సముద్రంతో కలుస్తుంది. గోర్జ్ లో ప్రవహించే నది పీఠభూమి మీదినుంచి వచ్చే సెలయేళ్ళ (Cascades) ను కలుపుకొంటుంది. గోర్జ్ నుంచి బయలు దేరిన తరవాత ఉత్తరానికి తీరమైదానంగుండా ప్రవహించి సముద్రంలో కలుస్తుంది.

ఈ వర్ణనను సమోన్నత రేఖామానచిత్రంగా 12వ పటంలో చూపినారు.

అభ్యాసము

1. ఒక అంగుళానికి 1 మైలుచూపే స్థలాకృతి మానచిత్రాల నుంచి కింది భూస్వరూపాలను గుర్తించి వాటి ఉనికిని సూచించండి.

(a) రిడ్జ్, (b) భృగువు, (c) ఎస్కార్ప్మెంట్, (d) వెడల్పునదీలోయ, (e) కుంభాకారనతి, (f) కోల్, (g) తీరమైదానము, (h) హిమగర్తము (Cirque) (i) 'U' ఆకారపు లోయ, (j) స్పర్.

2. క్రమనతి, కుంభాకారనతి, పుటాకారనతులను స్థలాకృతి మానచిత్రాల నుండి ఎన్నికచేసి వాటి పార్శ్వరేఖాచిత్రాలను గీసి వివరించండి.


3. కింద వర్ణించిన స్వరూపాలు ఉన్న స్థలాకృతిని 1/125,000 స్కేల్ పై గీసి చూపండి. సమోన్నతరేఖల మధ్యాంతరము 50 అడుగులు తీసుకోండి.

10 మైళ్ళ పొడవు, 10 మైళ్ళ వెడల్పు ఉన్న ఒక భూభాగానికి పడమటి వైపు సగభాగము ఎత్తుపల్లాలతోకూడిన ఒక పీఠభూమి ఉంది. ఆ పీఠభూమి ఉపరితలపు ఎత్తు 800 అడుగులనుంచి 950 అడుగులవరకు ఉంది. దానికి తూర్పున, ఉత్తరంనుంచి దక్షిణానికి వాలి ఉండే ఎస్కార్ప్మెంట్ తూర్పు సరిహద్దుకు రెండు మైళ్ళలోపున ఉంది. ఆ ఎస్కార్ప్మెంట్ కు తూర్పున ఉండే ప్రాంతం 200 అ. నుంచి 350 అ. ఎత్తుతో క్రమంగా తూర్పువైపు వాలుతూ తగ్గుతుంది. తూర్పుమైదాన ప్రాంతంలో అక్కడక్కడ చిన్నచిన్న కొండలు ఉన్నాయి. ఒక నది ఆ ఎస్కార్ప్మెంటుకు అడ్డంగా పశ్చిమంనుంచి తూర్పువైపు ప్రవహిస్తుంది.

4. కింది భూస్వరూపాలను సమోన్నతరేఖాకృతులలో గీసి చూపండి.

1. 'V' ఆకారపులోయ. 2. స్పర్. 3. గార్జ్. 4. కొండప్రాంతంలోని నోల్. 5. భృగువు. 6. రిడ్జ్, 7. హిమగర్తము. 8. ఆక్స్-బో-సరస్సు. 9. ఎస్కార్ప్మెంట్. 10. అగ్రాంతస్థమొరైన్ (Terminal moraine), 11. 'U' ఆకారపులోయ.

వీటిలో మొదటి రెండు దశలు సర్వేక్షణ విభాగము అయిన ప్రయోగ
దీపిక III (Surveying lab-manual III) లో వివరిస్తారు. కనక ప్రస్తుతము మనము
మూడవదశ అయిన సమోన్నతరేఖల అంతర్వేశనం (Interpolation of
contours) గురించి తెలుసుకొందాము.



పటము - 13 (A): స్థలోన్నతులను, వాగులను చూపే పటము.

సమోన్నతరేఖల అంతర్వేశనం చేసేటప్పుడు కొన్ని గమనికలను ముఖ్యంగా దృష్టిలో ఉంచుకోవలె. సమోన్నతరేఖలు పరస్పరము ఖండించుకోవు. భృగువు ఉన్నచోట మాత్రం అన్ని సమోన్నతరేఖలు కలిసిపోవడం సంభవిస్తుంది. పటం చూడండి, సమోన్నతరేఖలన్నీ వరసక్రమం తప్పకుండా గీయవలె. నదులను, వాగులను, ఏరులను, సమోన్నతరేఖలు ఒక్కసారిగా అడ్డంగా ఖండించవు. ఒకలోయను సమోన్నత రేఖలు దాటవలసి వచ్చినప్పుడు, అవి లోయకు సమాంతరంగా కొంతదూరము లోయ ఎగువకు వెళ్ళి, అక్కడదాటి మళ్ళీ దిగువకు సమాంతరంగా వస్తాయి. అందువల్ల ఏరులు, వాగులు, నదులు, సమోన్నతరేఖలను అంతర్వేశనం చేయడంలో మార్గదర్శకాలుగా ఉంటాయి.

ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని, పటంలో మనకిచ్చిన స్థలోన్నతులను ఆధారంగా చేసుకొని 500'; 550'; 600'; 650'; సమోన్నతరేఖలు 1కివ పటంలో చూపినట్లు అంతర్వేశనం చేయవలె.

పార్శ్వ రేఖాకృతి రేఖనము


(DRAWING OF PROFILE)

కొంకలు, మెట్టపల్లాలు ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఒక పక్కనుంచి చూస్తే మనకు కనపడే దృశ్యాన్ని ఆ ప్రాంతపు పార్శ్వ రేఖాకృతి (Profile) అంటారు. నది పుట్టిన ప్రదేశంనుంచి సాగరసంగమస్థానం వరకు దాని నతి, ఎత్తుపల్లాలు చూపే ఒక పార్శ్వరేఖాకృతిని గీసినట్లయితే అది ఆ నదియొక్క 'అనుదైర్ఘ్య పార్శ్వరేఖాకృతి' (Longitudinal profile) అవుతుంది.


మానచిత్రంలోని సమోన్నతరేఖలద్వారా ఆ ప్రాంతంలోని కొండల శిఖరాలు, వాటి వాలుల స్వభావము మనకు తెలియదు. వీటిని పూర్తిగా విస్మరించి, కళ్ళకు కట్టినట్లుగా చూపడానికి పార్శ్వరేఖాకృతిని గీసే అవసరము భూస్వరూప శాస్త్రాధ్యయనంలో ఎంతైనా ఉన్నది. ఈ పార్శ్వరేఖాకృతులను అవసరాన్నిబట్టి సక్రమ పార్శ్వరేఖాకృతి, (Serial profile), ఉపరిన్యస్త పార్శ్వరేఖాకృతి (Superimposed profile), సంయుక్త పార్శ్వరేఖాకృతి (Composite profile), ప్రక్షేపిత పార్శ్వరేఖాకృతి (Projected profile), మొదలైన విధాలుగా గీయవచ్చు.

పార్శ్వరేఖాకృతి గీసేవిధము

మానచిత్రంలోని AB అను రెండు బిందువులమధ్య పార్శ్వరేఖాకృతి గీయవలెనంటే ముందుగా ఒక కాగితపు అంచు సరళరేఖగా ఉండేటట్లు మడచి 14 (A) పటంలో చూపినట్లుగా ఆ కాగితపు అంచును AB బిందువులపై ఉంచి కాగితంపై ABలను గుర్తించండి. తరవాత AB రేఖను ఖండించే సమోన్నతరేఖలను, వాటి విలువలతోను, శిఖరాలు, స్థలోన్నతులు (Spot heights), నదిలోయలు మొదలగు వాటిని కాగితపు అంచుపై గుర్తించవలె. AB కి సమానమైన ఒక ఆధారరేఖను ఒక గ్రాఫ్ కాగితంపై గీయండి. ఆరేఖపై కాగితపు అంచు మీద ఉన్న గుర్తుల నన్నింటిని గుర్తించండి. AB రేఖకు రెండువైపుల లంబరేఖలను గీసి వాటిపై ఊర్ధ్వస్కేల్ (Vertical scale) గుర్తించండి. పటంలో తీసుకొన్న స్కేల్ 1 అం. = 1000 అడుగులు. ఈ స్కేల్ ప్రకారం నిలువుగ్రాఫ్ గళ్ళసహాయంతోను, అడ్డగళ్ళసహాయంతోను, సమోన్నత రేఖల విలువలు 'X' గుర్తుతోను సరిగా గుర్తించవలె. వీటినిన్నింటిని 14వ (B) పటంలో చూపినట్లు కలుపుతూ ఒక మృదువక్రరేఖను, శిఖరాలను, వాటి వాలులను దృష్టిలో ఉంచుకొని గీయవలె. ఏర్పడేది ABల మధ్య పార్శ్వరేఖాకృతి.



పటము-14 (A) పార్శ్వ రేఖాకృతి లేఖన పద్ధతి



పటము-14 (B) పార్శ్వరేఖాకృతి లేఖన పద్ధతి

ఇక్కడ ఊర్ధ్వస్కేల్ ఎన్నిక చేసుకోవడంలో ఒక విషయాన్ని మనము గుర్తించుకోవలె. గ్రాఫ్ కాగితంపై, మానచిత్ర ఊతిజసమాంతరస్కేల్ (Horizontal scale)ను మాత్రం ఉన్నదున్నట్లుగానే సూచించినాము. అంటే 1 అం. నికి 1 మైలు; ఊర్ధ్వస్కేల్ కూడా అంతే తీసుకోవలె. కాని మనము అట్లా చేయక 1 అం. = 1000 అ. లు తీసుకొన్నాము. అంటే ఊర్ధ్వస్కేల్ను కొన్ని రెట్లు పెద్దదిగా చేసి చూపినాము. దీనినే ఊర్ధ్వస్కేల్ అతిశయము అంటారు. భూమి మీది శిఖరాలను విశదంగా చూపడానికి ఇట్లా చేయవలె. ఊర్ధ్వస్కేల్ కూడా 1 అం. = 1 మైలు తీసుకొంటే కొండలు, లోయలు, వాటిమధ్య భేదము పార్శ్వరేఖాకృతిలో అసలు కనిపించదు. శిఖరాలు, నదులు, నదీలోయలు మచ్చుకె నా పార్శ్వరేఖాకృతిలో కనిపించవు. కాబట్టి ఊర్ధ్వస్కేల్ అతిశయాన్ని ఎక్కువగా తీసుకొంటే పార్శ్వరేఖాకృతి హాస్యాస్పదంగాను, తప్పుగానూ ఉంటుంది. సామాన్యంగా ఊర్ధ్వస్కేల్ అతిశయము 20 రెట్లకు మించరాదు. పటంలో తీసుకొన్న ఊర్ధ్వస్కేల్ అతిశయాన్ని లెక్కకట్టే పద్ధతిని ఇక్కడ ఇచ్చినాము.

ఊతిజ సమాంతరస్కేల్ 1 అం. నికి 63,360 అం. లు.

ఊర్ధ్వస్కేల్ 1 అం. నికి 1000×12 అం.లు. = 12,000 అం.లు.


ఊర్ధ్వస్కేల్ అతిశయము
$$= \frac{63,360}{12,000} = 5.28$$

ఊతిజసమాంతరస్కేల్ కన్న ఊర్ధ్వస్కేల్ 5.28 రెట్లు ఎక్కువ అని పార్శ్వరేఖాకృతి కింద వ్రాయవలె.

పార్శ్వరేఖాకృతిని మృదువక్రంగా కలిపేటప్పుడు రెండు సమవిలువల సమోన్నతరేఖలమధ్య భూమి ఎత్తుగా ఉందో, పల్లంగా ఉందో తెలియడానికి మానచిత్రంలో చూసి, కాగితపు అంచుపై మార్గదర్శక చిహ్నాలు '+' లేదా '—' పెట్టుకోవలె. వీటినిబట్టి పార్శ్వరేఖాకృతిని సరిగా గీయవచ్చు. అదేవిధంగా మానచిత్రంలోని నదీలోయలు, శిఖరాలపేర్లు, సరస్సులు మొదలైనవి కూడా పార్శ్వరేఖాకృతిలో గుర్తించవలె. ఈ పార్శ్వరేఖాకృతి ఏప్రాంతపు మానచిత్రంలో ఎక్కడనుంచి ఎక్కడకు గీయబడిందో గ్రిడ్ రేఖలద్వారాగాని, పటాన్ని అక్కడే గీయడంవల్ల గాని తెలియజేయవలె. పార్శ్వరేఖాకృతి గ్రాఫ్ కాగితం మీద గీయడం సులభము. లేదా డ్రాయింగ్ కాగితంపై గ్రాఫ్ గళ్ళు గీసుకోవడం వల్లగానీ, డ్రాయింగ్ కాగితం మీద గ్రాఫ్ కాగితం మీద గీసిన పార్శ్వరేఖాకృతిని ట్రేస్ తీసిగాని చేయవచ్చు.

ఉపరిన్యస్తపార్శ్వరేఖాకృతి

ఒక ప్రాంతపు మానచిత్రంలో సమాన మధ్యాంతరాల (Equal intervals)లో రేఖలుగీసి, వాటివద్ద భూభాగపు పార్శ్వరేఖాకృతుల నన్నింటినీ ఒకే చట్రంలో ఒకదానిపై ఒకటి గీస్తే, అది ఉపరిన్యస్త పార్శ్వరేఖాకృతి అవుతుంది.




పటము-15 (A) ఉపన్యస్త పార్శ్వ రేఖాకృతి

ఇట్లా గీయడంవల్ల ఆ పార్శ్వరేఖాకృతుల నన్నింటినీ పోల్చి చూడడానికి వీలవుతుంది. 15 (a) పటం చూడండి.

సంయుక్తపార్శ్వరేఖాకృతి

పైన చెప్పిన పార్శ్వరేఖాకృతుల అత్యున్నత భాగాలను మాత్రమే గీసిన పార్శ్వరేఖాకృతిని సంయుక్తపార్శ్వరేఖాకృతి అంటారు. పటం చూడండి. ఇట్లా



వరంగల్, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలు


పటము-15 (B) సంయుక్త పార్శ్వ రేఖాకృతి

గీయడంవల్ల ఒక ప్రాంతంలోని శిఖరాలను ఎక్కువ దూరం నుంచి చూస్తే కనిపించేటట్లు చిత్రించవచ్చు. 15 (b) పటం చూడండి.

ప్రక్షేపిత పార్శ్వరేఖాకృతి

దీనిలో ఒకదాని వెనక ఒకటి సమాంతరంగా తీసుకొన్న పార్శ్వరేఖాకృతులుంటాయి కాబట్టి, ముందువాటికన్నా ఎత్తుగా ఉన్న వెనక వాటి భాగాలు మాత్రమే కనిపిస్తాయి. ఈ ప్రక్షేపిత పార్శ్వరేఖాకృతిని చూస్తే ఆ ప్రాంతపు సర్వదిగ్దర్శక చిత్రం (Panoramic view)గా కనిపిస్తుంది. దీనిలో ఆ ప్రాంతపు ముందుభాగము, కొంత దూరంలో ఉన్న మధ్యభాగము, దూరాన ఉన్న భాగము,

వాటి వెనక ఉన్న ఆకాశము, దృక్పథం (Perspective)లో, సర్వదిగ్దర్శక చిత్రంలో వలెనే స్థూలంగా గోచరిస్తాయి. 15 (c) చూడండి.



పటము-15 (C) ప్రక్షేపిత పార్శ్వరేఖాకృతి.

అభ్యాసము


అతిచ్ఛేదితపీఠభూమి (Highly dissected plateau)కి చెందిన స్థలాకృతి మానచిత్రం తీసుకొని, దానిలో కొంత భాగాన్ని ఎన్నుకొని, ప్రక్షేపిత పార్శ్వ రేఖాకృతి (Projected profile), ఉపరిన్యస్త పార్శ్వరేఖాకృతి (Superimposed profile), సంయుక్తపార్శ్వరేఖాకృతి (Composite profiles) వీటిని గీయండి.

అంతర దృగ్గోచరత, మరుగుభూమి

తెలుసుకోవడం

(FINDING OUT INTERVISIBILITY AND DEAD GROUND)


ఒక ప్రదేశపు నిమోన్నతాలను, శిఖరాలను, వాటవాలులను విశదీకరించి, పరిశీలించేటప్పుడు ఒకచోటునుంచి మరొకచోటుకు చూస్తే ఆ రెండుచోట్లమధ్య అంతర దృగ్గోచరత (Intervisibility) ఉందా? లేదా? అనేవిషయము మాన చిత్రంలోని సమోన్నతరేఖల ద్వారా కనుక్కోవడానికి కొన్ని పద్ధతులున్నాయి.




పటము - 16 (A) అంతర దృగ్గోచరతను కనుక్కోనే పద్ధతి

16 (a) పటంలోని AB అనేబిందువుల మధ్య అంతరదృగ్గోచరత ఉంటుందా? ఉండదా అనేవిషయము ఆ రెండు బిందువులమధ్య పటంలో చూపినట్లుగా పార్శ్వరేఖాకృతిని గీసి, A నుంచి Bకి దృష్టిరేఖ (Line of sight) ను గీసి తెలుసుకోవచ్చు. 16(b) పటంలో దృష్టిరేఖను పార్శ్వరేఖాకృతి అడ్డుకొన్నది కాబట్టి A నుంచి చూస్తే, B కనిపించదని తెలుస్తుంది. అడ్డంవచ్చిన ఆ మరుగునుంచి B వరకు ఉన్న ప్రాంతమంతా A నుంచి కనిపించదు కాబట్టి ఆ ప్రాంతాన్ని అంతటినీ మరుగుభూమి (Dead ground) గా చూపినాము.

ఒక్కొక్కసారి AB ల మధ్య పూర్తి పార్శ్వరేఖాకృతి గీయడం అక్కరలేకుండానే, AB ల మధ్య అడ్డువస్తాయి అనుకొనే బిందువులను ఊర్ధ్వ-స్కేల్ ప్రకారం లంబరేఖలుగా నిలిపి అప్పుడు దృష్టిరేఖను A నుంచి Bకి గీసికూడా తెలుసుకోవచ్చు. 16 (c) పటం చూడండి.



పటము - 16 (B) అంతర దృగ్గోచరతను కనుక్కొనే పద్ధతి



పటము - 16 (C) అంతర దృగ్గోచరతను కనుక్కొనే పద్ధతి

ఈ పద్ధతులద్వారా మనము అంతరదృగ్గోచరత ఉంటుందా ? ఉండదా ? అనే విషయాన్ని నిర్ణయించేటప్పుడు ఏవైనా చట్టమైన చెట్లుగాని, మరే ఇతర అడ్డాలుగాని ఉంటాయా అనేది దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి.

మరుగుభూమిని గుర్తించడం

దృష్టిరేఖ కన్న ఎత్తున ఉన్న ఏ అడ్డంకి అయినా దానివెనక ఉన్న ప్రాంతాన్ని అంతటినీ మనముచూసే బిందువునుంచి కనిపించకుండా చేస్తుంది. ఈ కనిపించని ప్రాంతాన్నే మరుగుభూమి అంటారు. మరుగుభూమి పరిమితిని నిర్ణయించడానికి A నుండి అడ్డంకి ద్వారా దృష్టిరేఖను గీస్తే ఆరేఖ మళ్ళీ అవతలి వైపు భూభాగంపై ఎక్కడ స్పృశిస్తుందో అక్కడివరకు ఉన్న ప్రాంతమంతా మరుగుభూమి కిందికి లెక్కకు వస్తుంది. ఈ మరుగుభూమి పక్కల పరిధిని కూడా గుర్తించడానికి అడ్డంకి చుట్టూ దృష్టిరేఖలను గీస్తే, గుర్తించవచ్చు. మనము చూసే బిందువునుంచి చక్రం యొక్క ఆకుల (Spokes) వలె అన్ని వైపులకు దృష్టి రేఖలను గీసి, ఆరేఖలను మధ్యలో ఏబిందువులు అడ్డగిస్తాయో ఊహించి ఆ బిందువుల ఎత్తులను తెలుసుకొని, మనము నిలిచి చూస్తున్న బిందువు ఎత్తుతో వాటిని పోల్చి తెలుసుకోవచ్చు. ప్రతి బిందువు గుండాపోయే దృష్టిరేఖ ఎత్తు లెక్కకట్టవచ్చు. సమోన్నత రేఖలను బట్టి ఏ ప్రాంతమైతే దృష్టిరేఖ ఎత్తు కన్న తక్కువ ఉంటుందో ఆ ప్రాంతమంతా మరుగుభూమి కింద పరిగణించవలె.

వివరించిన ఈ పద్ధతులన్నీ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ (Military operations) లో చాలా ముఖ్యమైన భాగము.

అభ్యాసము

కొండలు, గుట్టలు ఉన్న స్థలాకృతి మానచిత్రాన్ని తీసుకొని, దానిలో ఒక కొండపైనుంచి చూస్తే కనిపించే ప్రాంతాన్ని, మరుగుభూమిని పైన చెప్పిన రెండు పద్ధతులలో గుర్తించండి.


మానచిత్ర ప్రక్షేపాలు

(MAP PROJECTIONS)

మానచిత్ర ప్రక్షేపము అంటే గోళంమీద ఉన్న అక్షాంశ-రేఖాంశాలను ఒక సమతలంమీదికి మార్చి గీసే ఒక క్రమపద్ధతి.

భౌగోళిక గ్రిడ్ను చాని గోళాకారంనుంచి భూమి ఉపరితలాన్ని అంత దూరం గాని కొంతభాగాన్నిగాని మనకు కావలసిన రీతిలో సమతలంమీదికి మార్చడం ఒక సమస్య. భూగోళానికి ప్రతిరూపమైన గ్లోబ్ (Globe) ఉన్నట్లయితే అసలు మనకు ఈ సమస్యేరారు. కాని గ్లోబ్మీద చాలా ముఖ్యమైన భౌగోళిక వివరాలను మాత్రమే చూపగలము. భౌగోళిక వివరాలను సంపూర్ణంగా చూపవలెనంటే సమతలంగా ఉన్న పెద్దపెద్ద మానచిత్రాలలో మాత్రమే ఏలవుతుంది. సమతలంగా ఉన్న మానచిత్రాలు ఎంత పెద్దవైనా వాటిని చిన్నవిగా మనవి తేలికగా ఉవయోగించవచ్చు. కాబట్టి భౌగోళిక గ్రిడ్ను సమతలంమీదికి మార్చడం ఎంతైనా అవసరము. ఈ పని భౌగోళిక గ్రిడ్లోని రేఖలను గ్లోబ్ మధ్యభాగంనుంచి కాంతికిరణాలను ప్రసరింపజేసి, ఆ రేఖల ఛాయలను సమతలంగా ఉన్న కాగితంపై ప్రక్షేపించడంవల్ల సాధ్యమవుతుంది. కాగితాన్ని గ్లోబ్ చుట్టూ శంకువు ఆకారంలో గాని స్తూపాకారంలోగాని చుట్టి, కాంతిని గ్లోబ్ మధ్యభాగం నుంచి ప్రసరింపజేస్తే భౌగోళిక-గ్రిడ్ రేఖల ఛాయలను కాగితంపై గుర్తించవచ్చు. తరవాత శంకువునుగాని స్తూపాన్నిగాని ఒకచోట నిలుపుగా కత్తిరించి సమతలంగా పరచవచ్చు. కాని గ్లోబ్ను కాగితము ఒకచోట మాత్రమే స్పృశిస్తుంది. కాబట్టి ఆ స్పృశించిన చోట మాత్రమే భౌగోళిక-గ్రిడ్ రేఖలు సరిగా గుర్తించబడుతాయి. మిగిలిన రేఖలన్నీ కొంత మార్పుచెంది గుర్తించబడుతాయి.

గ్లోబ్ చుట్టూ కాగితాన్ని శంకువు ఆకారంలో లేదా, స్తూపాకారంలో చుట్టి గాని, సమతలంగా గ్లోబ్ మీద ఎక్కడో ఒకచోట ఉంచిగాని, కాంతిని ప్రసరింపజేసి, అక్షాంశ రేఖాంశాలను ప్రక్షేపించడంవల్ల వచ్చిన ప్రక్షేపాలను దృష్టికోణ ప్రక్షేపాలు (Perspective projections) అంటారు. ఈ మూడు రకాలుగా కాగితాన్ని గ్లోబ్ చుట్టూ ఉంచడం 17వ పటంలో చూపినారు. ఈ విధంగా ప్రక్షేపాలను గీస్తే గ్లోబ్ను కాగితము ఒకేచోట స్పృశిస్తుంది. ఆ స్పృశించిన అక్షాంశ రేఖాంశాల వద్ద మాత్రమే ప్రక్షేపము అన్నివిధాలా (అంటే ఆకారంలోను, స్కేల్ లోను, దిశలోను, విస్తీర్ణంలోను) సరిగా ఉంటుంది. కాని దీనికి దూరంగా వెళ్ళేకొద్దీ ఆ అక్షాంశ ప్రాంతాలన్నీ ఎక్కువగా విరూపత (Distortion)ను



చెందుతాయి. కాబట్టి అటువంటి విరూపతను సరిచేయడానికి కొన్నికొన్ని అవసరమైన మార్పులు చేసి ప్రక్షేపాలను గీయడం జరిగింది. అట్లా గీసిన ప్రక్షేపాలను సాంప్రదాయిక (Conventional) లేదా గణితీయ (Mathematical) ప్రక్షేపాలు అంటారు. వీటిలోమన పాఠ్యభాగానికి ముఖ్యమైన వాటిని చూడవచ్చు.

1. సరళ శాంకవీయ ప్రక్షేపము (Simple conical projection).
2. రెండు ప్రామాణిక అక్షాంశాలు గల శాంకవీయ ప్రక్షేపము (Conical Projection with two standard parallels).
3. బోన్ ప్రక్షేపము (Bonne's projection).
4. బహు శాంకవీయ ప్రక్షేపము (Polyconic projection).
5. అంతర్జాతీయ ప్రక్షేపము (International projection).
6. ధ్రువ-శీర్ష సమక్షేత్ర ప్రక్షేపము (Polar zenithal equal-area projection,).
7. ధ్రువ-శీర్ష సమదూర ప్రక్షేపము (Polar zenithal equi-distant projection).
8. సరళ స్తూపాకార ప్రక్షేపము (Simple cylindrical projection).
9. మర్కేటర్ ప్రక్షేపము (Mercator Projection).
10. మాల్విడ్ ప్రక్షేపము (Mollweide Projection).
11. సైన్యసోయ్డల్ ప్రక్షేపము (Sinusoidal projection).
12. విచ్ఛిన్న మాల్విడ్ ప్రక్షేపము (Interrupted mollweide). projection).
13. అవిచ్ఛిన్న సైన్యసోయ్డల్ ప్రక్షేపము (Interrupted sinusoidal projection).

1. సరళ శాంకవీయ ప్రక్షేపము

ఈ ప్రక్షేపము దృష్టికోణ శాంకవీయ ప్రక్షేపం లోని లోపాలను సవరించి గీసింది. దృష్టికోణ శాంకవీయ ప్రక్షేపంవలెనే ఈ ప్రక్షేపంలో కూడా గ్లోబ్ ను కాగితము ఒకే ప్రామాణిక అక్షాంశం వద్ద స్పృశిస్తుంది. కాని దృష్టికోణ శాంకవీయ ప్రక్షేపంలోవలె ప్రామాణిక అక్షాంశంనుంచి ఉత్తరదక్షిణాలకు వెళ్ళేకొద్దీ వాటి మధ్యాంతరం పెరుగుతూ ఉండక, సమానంగానే ఉంటుంది. ఇట్లా ఉండడంవల్ల, ప్రామాణిక అక్షాంశం నుంచి దూరం వెళ్ళేకొద్దీ, ఆకారంలోనూ, స్కేల్ లోనూ వచ్చే విరూపత చాలా వరకు తగ్గించినారు. కాబట్టి ఈ ప్రక్షేపంలోని అక్షాంశ సమాంతరరేఖలు అన్నీ ఏకకేంద్రచాపాలు.

లెక్క : 35°తూ., 125°తూ. రేఖాంశాల మధ్య, 20°ఉ; 80°ఉ. అక్షాంశాల మధ్య వ్యాపించి ఉన్న భూభాగాన్ని సూచించడానికి, 15°ల మధ్యాంతరంతో, 1:200,000,000 స్కేల్ పై సరళ శాంకవీయ ప్రక్షేపాన్ని నిర్మించండి.

గ్రాఫిక్ - నిర్మాణక్రమము

ముందుగా ప్రామాణిక అక్షాంశాన్ని నిర్ణయించుకోవాలి. 20° , 35° , 50° , 65° , 80° ల అక్షాంశాలలో మధ్యగా ఉన్న 50° ల అక్షాంశాన్ని ప్రామాణిక అక్షాంశంగా తీసుకోండి. తరువాత స్కేల్ ప్రకారం తగ్గించిన భూమి, వ్యాసార్థము కనుక్కోవాలి.

$$\begin{aligned} \text{తగ్గించిన భూమి వ్యాసార్థము (R)} &= \frac{\text{భూమి అసలు వ్యాసార్థము}}{\text{స్కేల్ లోని హారము}} \\ &= \frac{250,000,000}{200,000,000} \text{ అం.} \\ &= 1.25 \text{ అం.} \end{aligned}$$

1.25 అం. వ్యాసార్థంతో ఒక వృత్తాన్ని గీయవాలి. వృత్తం మధ్యగా ECA రేఖ గీసి, భూమధ్యరేఖను సూచించవాలి. కేంద్రం C వద్ద, అక్షాంశరేఖాంశాల మధ్యాంతరమైన 15° లు, ప్రామాణిక అక్షాంశమైన 50° ల కోణాలు చేసి వృత్తాన్ని BTల వద్ద కలుసుకొనేటట్లు పొడిగించవాలి. T వద్ద స్పర్శరేఖ గీసి, అది CN రేఖను P వద్ద కలిసేటట్లు పొడిగించవాలి. 15° ల చాపం యొక్క AB పొడవును వ్యాసార్థంగా తీసుకొని కేంద్రం వద్ద ఒక అర్ధ వృత్తాన్ని గీయవాలి. అది CTని Y వద్ద ఖండిస్తుంది. CA కి సమాంతరంగా ఉండేటట్లు XY గీయవాలి. XY దూరము ప్రామాణిక అక్షాంశంపై ఉన్న రేఖాంశాల మధ్యాంతరము. ఇప్పుడు మనకు PT, ప్రామాణిక అక్షాంశ వ్యాసార్థంగాను, XY దాని మీది రేఖాంశాల మధ్యాంతరంగాను వచ్చినాయి.



రెండవపటంలో ఒక నిలువు రేఖను గీయవాలి. దానిమీది 'O' కేంద్రం నుంచి PT వ్యాసార్థంతో 50° ల ప్రామాణిక-అక్షాంశచాపాన్ని గీయవాలి. AB దూరంతో నిలువు రేఖపై 50° ల అక్షాంశం నుంచి 65° లు, 80° ల, అక్షాంశాలను పైకి, 35° లు, 20° ల అక్షాంశాలను కిందికి గుర్తించి వాటి చాపాలను కూడాగీయవాలి. ప్రామాణిక అక్షాంశంపై x y దూరము రేఖాంశాల మధ్యాంతరంగా తీసుకొని 35° ల నుంచి 125° ల వరకు గుర్తించవాలి. 'O' నుంచి ఈ బిందువుల గుండా రేఖాంశాలను గీసి. ప్రక్షేపాన్ని పూర్తిచేయవాలి.

గణితీయ నిర్మాణక్రమము

కింది సూత్రాల ద్వారా ప్రామాణిక అక్షాంశ వ్యాసార్థము, దానిమీది రేఖాంశాల మధ్యాంతరము, మధ్య రేఖాంశం (Central meridian) మీది అక్షాంశాల మధ్యాంతరము లెక్కకట్టవచ్చు.

$$\text{ప్రామాణిక-అక్షాంశ వ్యాసార్థము} = \frac{2 \pi R \cos \theta}{\text{లేదా}} \text{ అక్షాంశము.}$$

$$R. \text{ కాట్ } (\cot). \text{ అక్షాంశము,}$$



స్కేల్. 1: 200,000,000

పటము-18: శాంకరీయ ప్రక్షేపము

$$50^{\circ}\text{ల అక్షాంశము మీది రేఖాంశాల మధ్యాంతరము} = \frac{\pi R \cos 50^{\circ} \times 15}{360}$$

$$\text{మధ్య రేఖాంశం మీది అక్షాంశాల మధ్యాంతరము} = \frac{2 \pi R 15}{360}$$

ఇట్లా లెక్క కట్టిన కొలతలతో సరళ శాంకవీయ ప్రక్షేపాన్ని గీయవచ్చు.
లక్షణాలు :

1. అక్షాంశాలు ఏక కేంద్ర వృత్తాలు.
2. రేఖాంశాలు సరళ రేఖలుగా ఉన్న ఏక కేంద్ర వృత్తాల వ్యాసార్థాలు.
3. ప్రామాణిక అక్షాంశం గుండా మాత్రమే స్కేల్ సరి అయినది.
4. మధ్యరేఖాంశం గుండా మాత్రమే కాకుండా మిగిలిన రేఖాంశాల గుండా కూడా స్కేల్ సరిగా ఉంటుంది.
5. ధ్రువము ఏక కేంద్ర వృత్తాల కేంద్రం కాదు. అది అనంతదూరం నుంచి గీయబడిన ఒక చాపంగా సూచించబడుతుంది.
6. ప్రామాణిక అక్షాంశానికి రెండు వైపుల సన్నంగా కొంత దూరము స్కేల్ సరిగానే ఉంటుంది.

ఉపయోగము :— స్కేల్ ప్రా. అ. మీదమాత్రమే సరిగా ఉండడం వల్ల తూర్పు పడమరలకు కొద్దిగా వ్యాపించి, సన్నంగా ఉన్న ప్రాంతాలను చూపడానికి మాత్రమే ఈ ప్రక్షేపము ఉపయోగపడుతుంది.

2. రెండుప్రామాణికఅక్షాంశాల శాంకవీయప్రక్షేపము

సరళ శాంకవీయ ప్రక్షేపంలో ఒకే ప్రామాణిక-అక్షాంశాన్ని తీసుకొని గీయడంవల్ల ఆ అక్షాంశానికి రెండువైపుల కొంత మేరకు మాత్రమే స్కేల్ కు సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ శాంకవీయ ప్రక్షేపంలో రెండు ప్రామాణిక-అక్షాంశాలను తీసుకొని గీయడంవల్ల తూర్పు పడమరలకే కాకుండా, ఉత్తర దక్షిణాలకు కూడా స్కేల్ కు సరిపోతుంది.

లెక్క : 1:125,000,000 స్కేల్ పై 10° ఉ. 80° ఉ. అక్షాంశాల మధ్య 40° తూ, 160° తూ రేఖాంశాల మధ్య, ఉన్న భూభాగాన్ని చూపడానికి రెండు ప్రామాణిక-అక్షాంశాలతో శాంకవీయ ప్రక్షేపాన్ని నిర్మించండి. అక్షాంశరేఖాంశాల మధ్యాంతరము 10° లు.

గ్రాఫిక్-నిర్మాణము

ముందుగా 10° ఉ, నుంచి 80° ఉ, అక్షాంశాలలో రెండు ప్రామాణిక అక్షాంశాలను నిర్ణయించవలె. అవి మధ్యగా ఉన్న 30° ఉ, 60° ఉ. అక్షాంశాలు.

స్కేల్ 1:125,000,000

$$\begin{aligned} \text{స్కేల్ ప్రకారం తగ్గించిన భూమి వ్యాసార్థం (R)} &= \frac{250,000,000}{125,000,000} \text{ అం.} \\ &= 2 \text{ అం.} \end{aligned}$$

2 అం. ల వ్యాసార్థంతో ఒక వృత్తాన్ని గీయవలె. కేంద్రం C వద్ద, రేఖాంశ అక్షాంశాల మధ్యాంతరమైన 10° లు, ప్రామాణిక-అక్షాంశాలైన $30^\circ, 60^\circ$ లుగ కోణాలను చేయవలె. ఇవి వృత్తాన్ని వరసగా B, D, E ల వద్ద కలుస్తాయి. 10° ల చాపమైన AB వ్యాసార్థంతో కేంద్రం C వద్ద ఒక అర్ధవృత్తాన్ని గీయవలె. ఆ అర్ధ వృత్తము CD, CE లను ఖండించినచోట్ల CAకి సమాంతరంగా xy, ab లను గీయవలె. ఈ xy, ab లు వరసగా 30° లు, 60° ల ప్రామాణిక అక్షాంశాల మీది రేఖాంశాల మధ్యాంతరము.

$30^\circ, 60^\circ$ ల ప్రామాణిక-అక్షాంశాల వ్యాసార్థాలు కనుక్కోవడానికి రెండవ పటంలో చూపినట్లు ఒక నిలువు రేఖను గీసి, దానిపై 30° లు, 60° ల అక్షాంశాలను వాటి మధ్యాంతరంతో గుర్తించవలె. 30° ల వద్ద xy లంబరేఖనూ, 60° ల వద్ద ab లంబరేఖనూ గీసి xa లను కలుపుతూ నిలువురేఖను 'O' వద్ద కలిసే టట్లు ఒక రేఖను గీయవలె. ఇప్పుడు ob, oy లు వరసగా 60° లు, 30° ల అక్షాంశాల వ్యాసార్థాలు.

ఇప్పుడు మూడవపటంలో ఒక నిలువు రేఖను గీసి, దానిపై ob, oy వ్యాసార్థాలుగా $60^\circ, 30^\circ$ ల ప్రామాణిక-అక్షాంశాల చాపాలను గీయవలె. ఆ నిలువురేఖపై AB మధ్యాంతరంతో, మిగిలిన $10^\circ, 20^\circ, 40^\circ, 50^\circ, 70^\circ$ ల అక్షాంశాలను కూడా గుర్తించి, ఆ బిందువులగుండా 'O' కేంద్రంగా తీసుకొని వాటి చాపాలను కూడా గీయవలె. 60° ల అక్షాంశంపై ab మధ్యాంతరంతోనూ, 30° ల అక్షాంశంపై xy మధ్యాంతరంతోనూ. రేఖాంశాలను మధ్యరేఖాంశానికి రెండు వైపుల ఆరేసి భాగాల చొప్పున గుర్తించి, ఈ రెండు ప్రామాణిక-అక్షాంశాలమీది రేఖాంశ బిందువులను వరసరేఖలుగా కలుపుతూ రేఖాంశాలను గీయవలె. ఇప్పుడు మనకు కావలసిన ప్రక్షేపముపూర్తి అయింది.



గణితీయ నిర్మాణక్రమము :

రెండు ప్రామాణిక అక్షాంశాల వ్యాసార్థాలు, వాటి మీది రేఖాంశాల మధ్యాంతరము ఈ కింది సూత్రాలు ఆధారంగా తెలుసుకోవచ్చు.

$$(i) \text{ మధ్యరేఖాంశం మీది అక్షాంశాల మధ్యాంతరము} = 2\pi R. \frac{\text{మధ్యాంతరము}}{360}$$

$$(ii) \text{ } 30^\circ \text{ల ప్రామాణిక అక్షాంశం మీది రేఖాంశాల మధ్యాంతరము} \\ = 2\pi R. \text{కొసైన్ } 30^\circ \times \frac{10}{360}$$

$$(iii) \text{ } 60^\circ \text{ల ప్రా. అ. మీది రేఖాంశాల మధ్యాంతరము} \\ = 2\pi R. \text{కొసైన్ } 60^\circ \times \frac{10}{360}$$



పటము-19: రెండు ప్రామాణిక అక్షాంశాల శాంకవీయ ప్రక్షేపము

(iv) 60° ల ప్రా.అ. వ్యాసార్థము = y

$$y = 2\pi R. \frac{y - x}{360} \left[\frac{2\pi R. y - x}{360} \cdot \frac{\cos x - \cos y}{\cos x - \cos y} \right]$$

(v) 30° ల ప్రా.అ. వ్యాసార్థము = 60° ల ప్రా. అ. వ్యాసార్థము + $2\pi R. \frac{y - x}{360}$

గమనిక : $x, y, 30^\circ, 60^\circ$ ల ప్రా. అ. లు.

ఈ సూత్రాలు, ఆధారంగా వాటి విలువలు లెక్క కట్టి ప్రక్షేపాన్ని గీయ వచ్చు.

లక్షణాలు :

1. అక్షాంశ సమాంతర రేఖలు సమ మధ్యాంతరంగల ఏకకేంద్ర వృత్తాలుగా ఉంటాయి.
2. రేఖాంశాలు సరళరేఖలుగాను, ఏకకేంద్ర చాపాల వ్యాసాలుగాను ఉంటాయి.
3. స్కేల్ రెండు ప్రా. అ. ల మీద మాత్రమే సరిగా ఉంటుంది.
4. నిర్మాణాన్ని అనుసరించి మధ్యరేఖాంశం మీదిస్కేల్ సరిగా ఉంటుంది. మిగిలిన రేఖాంశాలు కూడా మధ్య రేఖాంశాల వలెనే సరళరేఖలు, ఏకకేంద్ర చాపాల వ్యాసార్థాలు కావడంవల్ల వాటి అన్నింటి మీది స్కేల్ కూడా సరిగా ఉంటుంది.
5. ప్రా. అ. ల మధ్యదూరాలు తక్కువగా వాటి బయటి దూరాలు ఎక్కువగా సూచిస్తారు.
6. ధ్రువము, అక్షాంశ చాపాల కేంద్రంగా ఉండక, వేరుగా ఒకవృత్త చాపంగా చూపబడుతుంది.

ఉపయోగము : ఈ ప్రక్షేపము తూర్పు పడమరలకు ఉత్తరదక్షిణాలకు కొంతవరకు వ్యాపించి ఉన్న భూప్రాంతాలను బాగా చూపడానికి ఉపయోగిస్తుంది. అందువల్ల ట్రాన్స్ సైబీరియన్ రైల్వే (Trans-Siberian railway) చూపడానికి బాగా పనికివస్తుంది. రష్యా, కెనడా మొదలైన పెద్ద దేశాలను చూపడానికి కూడా ఉపయోగిస్తుంది.

3. బోన్ ప్రక్షేపము లేదా శాంకవీయసమక్షేత్ర ప్రక్షేపము

(Bonne's projection or conical equal-area projection)

1:125,000,000 స్కేల్పై, 20° పశ్చిమ 80° తూర్పురేఖాంశాలు $35^\circ, 75^\circ$ ల ఉత్తర అక్షాంశాల మధ్య వ్యాపించి ఉన్న ప్రాంతానికి బోన్ ప్రక్షేపాన్ని గీయండి. ప్రక్షేప మధ్యాంతరము 10° లు.

గ్రాఫిక్ నిర్మాణక్రమము

$$\text{స్కేల్ ప్రకారం భూవ్యాసార్థము (R)} = \frac{250,000,000}{125,000,000} = 2 \text{ అం.}$$

2 అం.ల వ్యాసార్థంతో ఒక వృత్తాన్ని గీయవలె. వృత్తానికి భూమధ్యరేఖను చూపడానికి ఒక వ్యాసం గీయవలె. వృత్త కేంద్రం వద్ద $10^\circ, 35^\circ, 45^\circ, 55^\circ, 65^\circ, 75^\circ$ ల కోణాలను చేయవలె. మనము గీయవలసిన అక్షాంశాలలో నడిమిది అయిన 55° ల అక్షాంశాన్ని ప్రామాణిక అక్షాంశంగా తీసుకోవలె. ఈ 55° ల కోణము వృత్తపరిధిని ఖండించేచోట ఒక స్పర్శరేఖను గీయవలె. ఈ స్పర్శరేఖ భూమి అక్షాన్ని ఖండించే టట్లు అక్షాన్ని P వరకు పొడిగించవలె. స్పర్శరేఖ భూమి అక్షాన్ని ఖండించిన చోటు నుంచి స్పర్శబిందువు T వరకు ఉన్న పొడవు 55° ల అక్షాంశ వృత్త వ్యాసార్థము.

10° ల కోణము పరిధిపై చేసిన చాపంకొలతతో వృత్త కేంద్రం వద్ద ఒక పాదవృత్తం (Quadrant circle) గీయవలె. ఈ వృత్తము $35^\circ, 45^\circ, 55^\circ, 65^\circ, 75^\circ$ ల కోణాలను ఖండించినచోట్ల భూమధ్యరేఖకు భూమి అక్షం వరకు సమాంతర రేఖలు గీయవలె. వీటి దూరాలు ఆయా అక్షాంశాల మీది రేఖాంశ విభాగాల మధ్యాంతరాలు.

ఇప్పుడు ఒక నిలువు రేఖను గీయండి. 55° ల అక్షాంశ వ్యాసార్థంతో ఆ రేఖపై ఒక చాపాన్ని గీయవలె. ఇది ప్రామాణిక అక్షాంశము. దీనినుంచి 10° చాపదూరంతో మిగిలిన $35^\circ, 45^\circ, 65^\circ, 75^\circ$ అక్షాంశాలను కూడా గుర్తించవలె. ఆ బిందువులగుండా అన్ని చాపాలను గీయవలె. పాద వృత్తంలోని సమాంతరరేఖల దూరాలతో ఆయా అక్షాంశాల మీది రేఖాంశ మధ్యాంతరాలను కూడా గుర్తించవలె. ఇప్పుడు వీటన్నింటినీ కలుపుతూ రేఖాంశాలను కూడా గీయవలె. అక్షాంశ రేఖాంశాల డిగ్రీలను గుర్తించవలె.

గణిత నిర్మాణ క్రమము

1. ప్రామాణిక-అక్షాంశ వ్యాసార్థము = R కాట్ (Cot) అక్షాంశము.

2. మధ్య-రేఖాంశం మీది అక్షాంశాల మధ్యాంతరము = $2\pi R$. ప్ర.మ.

360



3. 35° ల అక్షాంశం మీది మధ్యాంతరము = మధ్య రేఖాంశంమీది అక్షాంశాల మధ్యాంతరము \times కొసైన్ (\cos) 35°

4. 45° ల ,, ,, = మధ్యరేఖాంశంమీది మధ్యాంతరము \times కొసైన్ 45°

5. 55° ల ,, ,, = మ.రే.మీది. మధ్యాంతరము \times కొసైన్ 55°

6. 65° ల ,, ,, = మ.రే. మీది. మధ్యాంతరము \times కొసైన్ 65°

7. 75° ల ,, ,, = మ.రే. మీది. మధ్యాంతరము \times కొసైన్ 75°



స్కేల్ 1:125,000,000

పటము-20: బోన్ లేదా శాంకరీయ సమక్షేత్ర ప్రక్షేపము

ఈ సూత్రాలు ఆధారంగా లెక్కకట్టి ప్రక్షేపాన్ని గీయవచ్చు.

లక్షణాలు

1. అక్షాంశాలు ఏకకేంద్ర వృత్తాలు.
2. మధ్యరేఖాంశాలు తక్కు మిగిలిన రేఖాంశాలన్నీ మృదు వక్రరేఖలు.
3. అక్షాంశాలమీది భాగాలను సరిగా చేసినాము కాబట్టి వాటిమీది స్కేల్ సరిఅయినది. అందుచేత తూర్పు, పడమరల దూరాలు సరిగా సూచిస్తారు.
4. అన్ని అక్షాంశాలు నిజమైన స్కేల్ కు గీసిన ప్రామాణిక-అక్షాంశాలు అయినప్పటికి, వాటి వక్రత ప్రామాణిక-అక్షాంశంగా ఎన్నుకొన్నదాని వక్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
5. మధ్యరేఖాంశం మీది స్కేల్ మాత్రమే సరిఅయినది. మిగిలిన రేఖాంశాలమీది స్కేల్ మధ్యరేఖాంశంనుంచి పక్కలకు వెళ్ళినకొద్దీ అతిశయించబడుతుంది.
6. ఇది సమక్షేత్రప్రక్షేపము. ఈ ప్రక్షేపంలోని చతుర్భుజాల వైశాల్యము సమంగా ఉంటుంది.
7. మధ్యరేఖాంశంనుంచి దూరంవెళ్ళేకొద్దీ ఆకృతిలోని మార్పు హెచ్చుతూ ఉంటుంది.

ఉపయోగము

వైశాల్యము సరిగా చూపబడుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రక్షేపము యూరప్, ఉత్తరమెరికా, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాలను చిత్రించడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఆసియావంటి ఖండాలు ఎక్కువగా తూర్పు, పశ్చిమాలకు వ్యాపించి ఉంటాయి. కాబట్టి మధ్యరేఖాంశానికి దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాలు ఆకృతిలో ఎక్కువ మార్పుచెందుతాయి. అటువంటివాటికి ఈ ప్రక్షేపము ఉపయోగపడదు.

4. బహు శాంకవీయ ప్రక్షేపము

(Polyconic projection)

1:125,000,000 స్కేల్ పై, 15° మధ్యాంతరంతో, 15° ప. నుంచి 165° తూ. వరకు, 0° ఉ. నుంచి 90° ఉ. వరకు వ్యాపించి ఉన్న ప్రాంతాన్ని చూపడానికి బహుశాంకవీయ ప్రక్షేపాన్ని గీయండి.

గ్రాఫిక్ నిర్మాణక్రమము


ఉ. భి. 1:125,000,000 స్కేలుప్రకారం

$$\text{తగ్గించిన భూమి వ్యాసార్థము (R)} = \frac{250,000,000}{125,000,000} \text{ అం.} = 2 \text{ అం.}$$

2 అం. వ్యాసార్థంతో ఒక వృత్తాన్ని గీయవలె. ప్రక్షేప మధ్యాంతరం 15° కాబట్టి మనకు అవసరమైన 15°, 30°, 45°, 60°, 75° ల కోణాలను వృత్త కేంద్రం వద్ద చేయవలె. ఈ కోణాలు వృత్తపరిధిని ఖండించిన బిందువులవద్దస్పర్శ

రేఖలను గీయవలె. ఇవి పొడిగించిన వృత్త-అక్షాన్ని కలుస్తాయి. ఈ కలయిక స్థానాలనుంచి స్పర్శబిందువుల వరకు ఉన్న స్పర్శరేఖల పొడవులే ఆయా డిగ్రీల అక్షాంశాలు గీయడానికి అవసరమైన వ్యాసార్థాలు.

15°ల చాపంపొడవు వ్యాసార్థంగా తీసుకొని వృత్తకేంద్రం వద్ద ఒక వృత్తాన్ని గీయవలె. ఈ వృత్తము 15°, 30°, 45°, 60°, 75°ల కోణాలు ఖండించిన బిందువులగుండా భూమధ్యరేఖకు సమాంతరరేఖలు గీయవలె. వీటి దూరాలు ఆయా అక్షాంశాల మీది రేఖాంశాల మధ్యాంతరము.



పటము-21 : బహుశాంకవీయ ప్రక్షేపము

ఇప్పుడు "మధ్యరేఖాంశం"గా ఉండేటట్లు ఒక నిలువురేఖ గీయవలె. దానిపై 15°ల చాప దూరంతో 15°, 30°, 45°, 60°, 75°ల అక్షాంశాలను గుర్తించవలె. వీటిపై వృత్తరేఖలని పెన్సిలు వైపు చివరిభాగం న్ని మధ్యరేఖాంశంమీది విభాగాలపై ఉంచి స్పర్శరేఖల పొడవులు వ్యాసార్థాలుగా తీసుకొని కేంద్రాలను

మార్పుతూ ఆయా అక్షాంశాల చాపాలను గీయవలె. అంటే ఈ చాపాలన్నీ ఏక కేంద్ర చాపాలు కావు. ఈ అక్షాంశాలపై ఆయా రేఖాంశాల మధ్యాంశరాలతో రేఖాంశాలను కూడా గుర్తించవలె. ఆ బిందువులను మృదువక్రాలతో కలిపి రేఖాంశాలను గీయవలె. ఇప్పుడు అక్షాంశ, రేఖాంశాల డిగ్రీలు గుర్తించవలె. మనకు కావలసిన ప్రక్షేపము పూర్తి అయింది.

గణితీయ నిర్మాణక్రమము

$$\text{మధ్యరేఖాంశంమీది మధ్యాంతరము} = \frac{2\pi R \times \text{ప్రక్షేపమధ్యాంతరము}}{360}$$

వివిధ అక్షాంశాలమీది మధ్యాంతరము = మధ్యరేఖాంశంమీది మధ్యాంతరము \times కొసైన్ (Cos) అక్షాంశము.
లేదా

$$\frac{2\pi R \text{ కొసైన్ (Cos.) అక్షాంశము} \times \text{ప్ర. మ.}}{360}$$

వివిధ అక్షాంశాల వ్యాసార్థాలు = R. కాంట్ (Cnt), అక్షాంశము.

ఈ పై సూత్రాలను ఆధారంగా చేసుకొని కొంతను లెక్కకట్టి మనకు కావలసిన బహుశాంకవీయ ప్రక్షేపాన్ని గీయవచ్చు.

లక్షణాలు

1. అక్షాంశాలు ఏక కేంద్రచాపాలు కావు. వేరువేరు కేంద్రాలు గలవి.
2. మధ్యరేఖాంశం తప్పించి మిగిలిన రేఖాంశాలన్నీ క్రమమైన వంపులుగా ఉంటాయి. మధ్యరేఖాంశం మాత్రం భూమధ్యరేఖకు లంబంగా ఉన్న ఒక నిలువు రేఖ. దీనిమీద అక్షాంశాల మధ్యాంతరం సరిగా ఉంటుంది.
3. అన్ని అక్షాంశాలూ ప్రామాణిక అక్షాంశాలుగా ఉంటాయి. అందుచేత తూర్పుపడమరలకు వ్యాపించి ఉన్న దూరాలు సరిగా ఉంటాయి.
4. ఉత్తర, దక్షిణాలకు వ్యాపించి ఉన్న దూరాలు, మధ్యరేఖాంశంమీద మాత్రం సరిగా ఉంటాయి. మిగిలిన రేఖాంశాలన్నింటిమీద స్కేల్ అతిశయించబడి ఉంటుంది.

ఉపయోగము

మధ్యరేఖాంశం నుంచి పక్కలకు వెళ్లేకొద్దీ స్కేల్ లో తప్పు ఎక్కువ కానడంవల్ల ఈ ప్రక్షేపము ఎక్కువ విస్తీర్ణమున్న ప్రాంతాలకు పనికిరాదు. ఉత్తర దక్షిణాలకు వ్యాపించిఉన్న ప్రాంతాలను చిన్నచిన్న షీట్ లలో గీసి, వాటిని కలిపేటందుకు ఉపయోగిస్తుంది. సమోష్ణనుండలాలలోని ఎక్కువ అక్షాంశ వ్యాప్తి తక్కువ రేఖాంశవ్యాప్తి ఉన్న దేశాలను బాగా చూపవచ్చు.

5. అంతర్జాతీయ మానచిత్ర ప్రక్షేపము

(International map projection)

ఈ ప్రక్షేపము ప్రపంచ మానచిత్రాన్ని 1:1,000,000 స్కేల్లో గీయడానికి ఉద్దేశించ బడింది. బహు శాంకవీయ ప్రక్షేపంలో మానచిత్రాలు అన్నీ కలిపి అమరిస్తే వాటి అన్ని పక్కలూ సరిగా అమరవు. ఉత్తర దక్షిణాలవై పు అంచులు మాత్రమే అమరుతాయి. రేఖాంశాలు వక్రాలు కావడంవల్ల మధ్యరేఖాంశంనుంచి దూరానికి వెళ్ళేకొద్దీ వాటి వక్రత పెరగడంవల్ల, తూర్పు, పడమటి అంచులు అమరవు. అందువల్ల బహుశాంకవీయ ప్రక్షేపంలో కొన్ని మార్పులు చేసి, అంతర్జాతీయ మానచిత్ర ప్రక్షేపాన్ని తయారు చేసినారు. ఆ మార్పులు:

1. తూర్పు పడమటి అంచులు కూడా సరిగా అమరడానికి రేఖాంశాలను సరళరేఖలుగా మార్చవలె. పైన, కింద ఉన్న అక్షాంశాలను స్కేల్కు సరిగా బహు శాంకవీయ ప్రక్షేపంలో వలెనే గీయవలె.

2. స్కేల్కు సరిగా గీసిన రేఖాంశము ఒకటికాక రెండు ఉంటాయి. మధ్య రేఖాంశము దాని అసలు పొడవు కన్న తక్కువ ఉంటుంది. మధ్య రేఖాంశానికి రెండు వైపుల 2°లు మాత్రం స్కేల్కు సరిగా ఉంటాయి. 60°లు ఉత్తర దక్షిణాలు దాటిన తరువాత 88° ఉత్తర దక్షిణ అక్షాంశాల వరకు 4°లు స్కేల్కు సరిగా ఉంటాయి. ఇట్లా గీయడంవల్ల, బహు శాంకవీయ ప్రక్షేపంలో కన్న అతి శయము తక్కువ అవుతుంది.

అంతర్జాతీయ మానచిత్ర ప్రక్షేపంలోని మానచిత్రము ఒక్కొక్కటి 60° ఉత్తర దక్షిణ అక్షాంశాల మధ్య 4°లు అక్షాంశాలు, 6° రేఖాంశాలతో ఉంటాయి. 60°లు 88°ల మధ్య రెండుగోళాలలోను, ఒక్కొక్క మానచిత్రము 4° అక్షాంశాలు 12°లు రేఖాంశాలతో ఉంటాయి. ధ్రువ ప్రాంతాలకు 4°ల అక్షాంశవ్యాసంతో రెండు మానచిత్రాలున్నాయి.

లెక్క : 24° ఉ నుంచి 28°ల ఉ. అక్షాంశం వరకు, 80°తూ. నుంచి 86°తూ. రేఖాంశం వరకు వ్యాపించిన ప్రాంతానికి అంతర్జాతీయ మానచిత్ర ప్రక్షేపాన్ని గీయండి.

నిర్మాణక్రమము

ఈ ప్రక్షేప నిర్మాణానికి 4° మధ్యాంతర వ్యాప్తి ఉన్న అక్షాంశాలను సరి చేసిన కొలతలు చూపే పట్టిక, అక్షాంశ రేఖాంశాల ఖండిత బిందువుల ఉనికి x, y నిర్దేశాంకాలలో ఇచ్చిన పట్టిక, అవసరము. ఆ రెండు పట్టికలు ఇవి.


ఈ ప్రక్షేపాన్ని గీయడానికి అవసరమయ్యే కొలతలు :

అక్షాంశము	నిర్దేశాంకాలు	మధ్యరేఖాంశం నుంచి	రేఖాంశాలు
		1°	2° 3°
24°	x	101.76	203.52 305.31
	y	0.36	1.45 3.25

28°	x	98.37	196.75	295.15
	y	0.40	1.61	3.63

24° నుంచి 28° వరకు అక్షాంశాలను సరిచేసిన పొడవు = 442.91 మి.మీ.

442.91 మి.మీ. కొలతతో ఒక ఊర్ధ్వరేఖను గీయవలె. పైన, కింద అక్షాంశాల నిర్దేశాంకాలు మధ్యరేఖాంశానికి. తూర్పున పశ్చిమాన గుర్తించవలె. ఈ నిర్దేశాంకాలను మృదువక్రాలుగా కలుపుతూ 24°లు; 28° ఉ: అక్షాంశాలను రెంటినీ గీయవలె. రెండు అక్షాంశాలమీది మధ్య రేఖాంశానికి తూర్పున పశ్చిమాన ఉన్న మొదటి రెండు నిర్దేశాంకాలను కలుపవలె. అట్లే రెండవ మూడవ నిర్దేశాంకాలు రెండు పక్కల కలుపవలె. ఇట్లాచేస్తే మనకు సరళరేఖలుగా ఉన్న 6 రేఖాంశాలు వస్తాయి. అన్ని రేఖాంశాలను నాలుగేసి సమాన భాగాలుచేసి వాటిని కలిపితే మిగిలిన అక్షాంశాలు వస్తాయి.



పటము-22: అంతర్జాతీయ మానచిత్ర ప్రక్షేపము

లక్షణాలు

1. ఈ ప్రక్షేపంలో మానచిత్రాలు సరిగా అమరడంకోసం సమక్షేత్ర యథాకృతి (Orthomorphism) అనే రెండు లక్షణాలు పోతాయి.
2. బహుశాంకవీయ ప్రక్షేపంలోవలెనే దీనిలో కూడా ప్రతి అక్షాంశము ఒక ప్రామాణిక-అక్షాంశమే. దీనిలో ప్రతి రేఖాంశ విభజన సరిగా జరిగింది. మధ్యరేఖాంశం మీద సరిచేసిన కొలతల పట్టిక.

అక్షాంశము	సహజమైన పొడవు	సరిచేసిన పొడవు
0° నుంచి 4°లు	442.27	442.00
4° నుంచి 8°లు	442.31	442.04

8° నుంచి 12° లు	442.40	442.14
12° నుంచి 16° లు	442.53	442.28
16° నుంచి 20° లు	442.69	442.45
20° నుంచి 24° లు	442.90	442.67
24° నుంచి 28° లు	443.13	442.91
28° నుంచి 32° లు	443.39	443.19
32° నుంచి 36° లు	443.68	443.50
36° నుంచి 40° లు	443.98	443.81
40° నుంచి 44° లు	444.29	444.14
44° నుంచి 48° లు	444.60	444.47
48° నుంచి 52° లు	444.92	444.81
52° నుంచి 56° లు	445.22	445.13
56° నుంచి 60° లు	445.52	445.44

అక్షాంశ రేఖాంశాల ఖండిత బిందువుల నిర్దేశాంకాలు మి. మీ. లలో
చూపే పట్టిక.

అక్షాంశము	నిర్దేశాంకాలు	మధ్యరేఖాంశంనుంచి రేఖాంశాలు		
		1°	2°	3°
0°	x	111.32	222.64	333.96
	y	0.00	0.00	0.00
4°	x	111.05	222.10	333.16
	y	0.07	0.27	0.61
8°	x	110.25	220.49	330.74
	y	0.13	0.54	1.21
12°	x	108.91	217.81	326.73
	y	0.20	0.79	1.78
16°	x	107.04	214.08	321.13
	y	0.26	1.03	2.32
20°	x	104.65	209.31	313.98
	y	0.31	1.25	2.81
24°	x	101.76	203.52	305.31
	y	0.36	1.45	3.25
28°	x	98.37	196.75	295.25
	y	0.40	1.61	3.63

	x	94.50	189.01	283.56
32°	y	0.44	1.75	3.93
	x	90.17	180.36	270.59
36°	y	0.46	1.85	4.15
	x	85.40	170.82	256.29
40°	y	0.48	1.92	4.31
	x	80.21	160.45	240.73
44°	y	0.49	1.95	4.38
	x	74.63	149.29	224.00
48°	y	0.48	1.94	4.36
		68.69	137.40	206.16
52°		0.47	1.89	4.25
	x	62.40	124.83	187.31
56°	y	0.45	1.81	4.06
	x	55.81	111.64	167.52
60°	y	0.42	1.69	3.80

6. ధ్రువ-శీర్ష సమదూర ప్రక్షేపము

(Polar zenithal equi-distant projection)

ఉత్తరార్ధగోళాన్ని చిత్రించడానికి 1 : 125,000,000 స్కేల్ పై 15° లు ప్రక్షేప మధ్యాంతరంతో ధ్రువ-శీర్ష సమదూర ప్రక్షేపాన్ని గీయండి.

నిర్మాణక్రమము

ఈ ప్రక్షేపము దృక్పథంలేని శీర్ష (Non-perspective zenithal) ప్రక్షేపము. కాబట్టి దీని నిర్మాణము కింది గణితాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

స్కేల్ ప్రకారం తగ్గించిన భూమి వ్యాసార్థము = (R)


$$= \frac{250,000,000}{125,000,000} = 2 \text{ అం.}$$

$$\text{ప్రక్షేపం మీది } 15^\circ \text{ల ప్రక్షేప మధ్యాంతరం పొడవు} = 2\pi R \frac{15}{360}$$

$$= \frac{2 \times 3.1416 \times 2 \times 15}{360}$$

$$= 0.524 \text{ అం.}$$

ఇప్పుడు ఒక నిలువు రేఖ గీయవలె. దానిపై 0.524 అం.ల మధ్యాంతరంతో 6 భాగాలు చేయవలె. మనముగీసే ప్రక్షేపము ఉత్తరార్ధ గోళాన్ని చిత్రించడం కోసం కాబట్టి, భూమధ్యరేఖనుంచి ఉత్తరధ్రువం వరకు 90° ఉంటాయి. ప్రక్షేప మధ్యాంతరము 15° లు, కాబట్టి 90/15 = 6 భాగాలు అవసరము. సటంలోని



'O' ను కేంద్రంగా తీసుకొని, ఈ భాగాల బిందువులగుండా ఏక కేంద్రవృత్తాలు గీయవలె. ఇవి ప్రక్షేప అక్షాంశ, రేఖాంశాలను 15° మధ్యాంతరంతో కేంద్రం నుంచి బయటి వృత్తపరిధివై పు సరళరేఖలు గీయవలె.

వీటిని కోణమానిని సహాయంతో చేయవచ్చు.

లక్షణాలు

1. అక్షాంశాలు ఏక కేంద్ర వృత్తాలు.
2. అక్షాంశాల మధ్యాంతరం నిజదూరమై సమానంగా ఉంటుంది.
3. రేఖాంశాలు నిలువు రేఖలుగా ఉంటాయి.
4. ఉత్తర, దక్షిణ ధ్రువాలలో ఒకటి ప్రక్షేప కేంద్రమై ఉంటుంది.
5. రేఖాంశాలమీది స్కేల్ సరిఅయినది కాబట్టి కేంద్రం నుంచి రేఖాంశాల బాహ్య బిందువులవై పు దూరాలు, దిశలు సరిగా ఉంటాయి.
6. అక్షాంశాల మీది స్కేల్ అంతటా సరికాదు. కేంద్రం నుంచి బయటకు వెళ్లేకొద్దీ స్కేల్ అతిశయము ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడి విస్తీర్ణంలో కూడా అతిశయము ఉంటుంది.

ఉపయోగము

ఈ ప్రక్షేపము ధ్రువప్రాంతాలను చూపడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అప్పుడప్పుడు పూర్తి అర్థగోళాన్ని చూపడానికి కూడా ఉపయోగించవచ్చు. కేంద్రంనుంచి బయటకు వెళ్లేకొద్దీ విస్తీర్ణం అతిశయించి

ఉంటుంది. కాబట్టి భూమధ్య రేఖాప్రాంతాలు ఉన్నదాని కంటే పెద్ద విగా ఉంటాయి. సాధారణంగా ఈ ప్రక్షేపము 50°లు 90°లు మధ్య ఉన్న ధ్రువ ప్రాంతాలను చూపడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది.

7. ధ్రువ-శీర్ష సమక్షేత్ర ప్రక్షేపము లేదా లాంబర్ట్ సమక్షేత్ర ప్రక్షేపము లేదా లాంబర్ట్ దిగంశీయ తుల్య ప్రక్షేపము

(Polar zenithal equal area projection or Lambert's equal-area projection or Lamberts azimuthal equivalent projection)

1:125,000,000 స్కేల్ పై, 15°ల ప్రక్షేపమధ్యాంతరంతో ఉత్తరార్ధ గోళాన్ని చిత్రించడానికి ధ్రువ-శీర్ష సమక్షేత్ర ప్రక్షేపం (Polar zenithal equal-area projection) గీయవలె.

గ్రాఫిక్ నిర్మాణక్రమము

$$\text{స్కేల్ ప్రకారం తగ్గించిన భూమి వ్యాసార్ధము (R)} = \frac{250,000,000}{125,000,000} = 2 \text{ అం.లు.}$$

2 అం. లు వ్యాసార్ధంతో 'O' కేంద్రంగా ఒక వృత్తాన్ని గీయవలె. దానిలో OF, ON లను, భూమధ్యరేఖను భూమి అక్షాన్ని గీయవలె. 'O' కేంద్రం వద్ద 15°, 30°, 45°, 60°, 75° కోణాలను చేస్తే అవి వృత్తపరిధిని E, D, C, B, Aల వద్ద ఖండిస్తాయి. ఇప్పుడు NA, NB, NC, ND, NE, NFలను కలుపుతూ వృత్త జ్యా (Chord) లను గీయవలె. వీటి దూరాలే మనము గీయవలసిన అక్షాంశ వృత్తాల వ్యాసార్ధాలు.



ఇప్పుడు ఈ వ్యాసార్ధాలతో 0° ఉ. నుంచి 90°ల ఉ. అక్షాంశాలు గీయవలె. రేఖాంశాలను నిలువురేఖలుగా, కోణమానిని సహాయంతో 15°లు మధ్యాంతరంతో గీయవలె.

గణితీయ నిర్మాణక్రమము

$$R = \frac{200,000,000}{125,000,000} = 2 \text{ అం.లు.}$$

$$\begin{aligned} 75^\circ \text{ ల అక్షాంశ వృత్తవ్యాసార్ధము} &= 2 R \cdot \sin \frac{\text{Co.lat}}{2} \\ &= 2 \times 2 \cdot \sin (15/2) \\ &= 2 \times 2 \times 0.1305 = 0.52 \text{ అం.లు.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 60^\circ \text{ ల అక్షాంశ వృత్తవ్యాసార్ధము} &= 2 R \cdot \sin \frac{30^\circ}{2} \\ &= 2 \times 2 \times 0.2588 \text{ అం.} = 1.03 \text{ అం.} \end{aligned}$$



స్కేల్ 1:125,000,000

పటము-24 : ధ్రువ-శీర్ష సమక్షేత్ర లేదా లాంబార్ట్ సమక్షేత్ర ప్రక్షేపము

$$45^{\circ}\text{ల అక్షాంశ వృత్తవ్యాసార్థము} = 2R. \sin \frac{45}{2}$$

$$= 2 \times 2 \times 0.3827 = 1.53 \text{ అం.}$$

$$30^{\circ}\text{ల అక్షాంశ వృత్తవ్యాసార్థము} = 2R. \sin \frac{30}{2}$$

$$= 2 \times 2 \times 0.5 = 2.0 \text{ అం.}$$

$$15^{\circ}\text{ల అక్షాంశ వృత్తవ్యాసార్థము} = 2R. \sin \frac{15}{2}$$

$$= 2 \times 2 \times 0.6083 = 2.43 \text{ అం.}$$

$$0^{\circ}\text{ల అక్షాంశ వృత్తవ్యాసార్థము} = 2R. \sin \frac{90}{2}$$

$$= 2 \times 2 \times 0.707 = 2.8 \text{ అం.}$$

ఈ లెక్కల సాయంతోను, కోణమానిని సాయంతోను, అక్షాంశరేఖాంశాలు గీసి ప్రక్షేపాన్ని పూర్తిచేయవలె.

లక్షణాలు

1. అక్షాంశాలు ఏక కేంద్రవృత్తాలు.
2. అక్షాంశాల మధ్యాంతరము కేంద్రంనుంచి బయటకు తగ్గుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అవి అసలైన దూరాలలో గీయబడిలేవు.
3. అక్షాంశాలమీది దూరాలు కేంద్రంనుంచి బయటకు వెళ్ళేకొద్దీ ఎక్కువగా పెరుగుతాయి. కాని ఈ దూరాల అతిశయము రేఖాంశాలమీది దూరాలు తగ్గడం వల్ల పరిహరించబడుతుంది. కాబట్టి విస్తీర్ణము సరిగానే ఉంటుంది.

ఉపయోగము

ఈ ప్రక్షేపము ధ్రువప్రాంతాలను చూపడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అర్ధగోళాన్ని కూడా పూర్తిగా చూపవచ్చు. కాని కేంద్రంనుంచి బయటకు వెళ్ళే కొద్దీ ఆకృతిలో కొంత మార్పు వస్తుంది. ఒక్కొక్కదేశాన్ని చూపడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

8. సరళ స్తూపాకార ప్రక్షేపము

(Simple cylindrical projection)

1 : 200,000,000 స్కేల్ పై ప్రపంచమానచిత్రాన్ని గీయడానికి 15° లు ప్రక్షేప మధ్యాంతరం తీసుకొని సరళస్తూపాకార ప్రక్షేపాన్ని గీయవలె.

గ్రాఫిక్ నిర్మాణక్రమము

$$\text{స్కేల్ ప్రకారం భూమి వ్యాసార్థము} = \frac{250,000,000 \text{ అం.}}{200,000,000 \text{ అం.}}$$

$$= 1.25 \text{ అం.}$$

1.25 అం. ల వ్యాసార్థంతో 'O' కేంద్రంగా ఒక వృత్తాన్ని గీయవలె. EQ భూమధ్యరేఖా వ్యాసాన్ని గీయవలె. NS అక్షాన్ని కూడ గీయవలె 'O' వద్ద ప్రక్షేప మధ్యాంతరమైన 15° కోణాన్ని చేయవలె. ఈకోణము వృత్తపరిధిపై XY చాపాలను చేస్తుంది. ఈ XY చాపంపొడవు ప్రక్షేపంలోని అక్షాంశ, రేఖాంశాల సదుమ ఉన్న మధ్యాంతరము.

ఇప్పుడు భూమధ్యరేఖను సూచించడానికి అడ్డంగా ఒక సరళరేఖను గీయవలె.

ఈరేఖను XY పొడవుతో 24 భాగాలు చేయవలె $\left(\frac{360}{15} = 24 \text{ భాగాలు}\right)$. ఈ

భాగాలవద్ద పైకి క్రిందికి లంబరేఖలను గీయవలె. వీటినికూడ XY దూరంతో పైకి 6 భాగాలు, కిందికి 6 భాగాలు చేయవలె. ఇప్పుడు ఆయాభాగాలను కలుపుతూ అక్షాంశాలను గీయవలె. డిగ్రీలు గుర్తించవలె ఇప్పుడు ప్రక్షేపము పూర్తి అయింది.

గణితీయ నిర్మాణక్రమము

$$R = \frac{250,000,000 \text{ అం.}}{200,000,000 \text{ అం.}}$$

$$= 1.25 \text{ అం. లు.}$$

స్కేల్ ప్రకారం భూమధ్యరేఖ పొడవు $= 2\pi R$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 1.25$$

$$= 6.3 \text{ అం. లు.}$$

అక్షాంశరేఖాంశాల మధ్యాంతరము $= 2\pi R \times \frac{\text{ప్రక్షేప మధ్యాంతరము}}{360}$



$$= 6.3 \times \frac{15}{360}$$

$$= 0.26 \text{ అం. లు.}$$

ఈ కొలతలతో మనకు కావలసినన్ని అక్షాంశరేఖాంశ విభాగాలను చేసుకొని ప్రక్షేపాన్ని గీయవలె.

లక్షణాలు

1. అక్షాంశ రేఖాంశాలు సరళరేఖలుగా ఉంటాయి.
2. అక్షాంశరేఖాంశాలు సమాన మధ్యాంతరాలు గలవి. అందు వల్ల దీనిని సమదూర స్తూపాకార ప్రక్షేపము (Equi-distant cylindrical projection) అంటారు.
3. అక్షాంశ రేఖాంశాలు సమకోణాలు చేసేటట్లు, ఒకదానినొకటి ఖండించుకొంటాయి.
4. భూమధ్యరేఖ మీద స్కేల్ సరిగా ఉంది. కాబట్టి, దానిమీది దూరాలు



స్కేల్ 1:200 M

పటము-25: సరళ స్థూపాకార ప్రత్యేకము

కూడ సరిగా ఉంటాయి. మిగిలిన అన్ని అక్షాంశాలమీద ఆదూరాలు అతిశయించబడి ఉంటాయి.

ల. రేఖాంశాలమీది స్కేల్ సరిగా ఉంటుంది.

ఉపయోగము

ఈ ప్రక్షేపంలో భూమధ్య రేఖకు రెండు వైపుల సన్నని ప్రాంతాన్ని, అంటే సుమారు 2° 30' ఉత్తర, దక్షిణ అక్షాంశాల మధ్య ప్రాంతాన్ని మాత్రమే సంపూర్ణ కరంగా చూప వీలవుతుంది. ప్రపంచమంతటినీ చూపడానికి అంత తృప్తికరంగా ఉండదు.

9. స్తూపాకార సమక్షేత్ర ప్రక్షేపము

(Cylindrical equal-area projection)

1:250,000,000 స్కేల్ లో ప్రపంచ మానచిత్రాన్ని గీయడానికి 15°లు ప్రక్షేపమధ్యాంతరం తీసుకొని స్తూపాకార సమక్షేత్ర విక్షేపాన్ని గీయవలె.

$$\begin{aligned}\text{స్కేల్ ప్రకారం భూమి వ్యాసార్థము} &= \frac{250,000,000 \text{ అం.}}{250,000,000 \text{ అం.}} \\ &= 1 \text{ అం.}\end{aligned}$$

ఇప్పుడు 1 అం. వ్యాసార్థంతో ఒక వృత్తాన్ని గీయవలె. EQ భూమధ్య రేఖా వ్యాసాన్ని, NS భూమి అక్షవ్యాసాన్ని గీయవలె. దానికేంద్రం "O" వద్ద మనకు కావలసిన 15°, 30°, 45°, 60°, 75°ల కోణాలను చేయవలె. భూమధ్య రేఖ వ్యాసాన్ని పొడిగించండి. దీనిపై 15°ల చాపదూరంతో 24 రేఖాంశ భాగాలను చేయవలె. ఆ భాగాల నుంచి పైకి కిందికి భూమధ్య రేఖకు లంబాలు గీయవలె. కోణాలు చేసిన వ్యాసార్థాలు, పరిధిని A, B, C, D, E ల వద్ద ఖండిస్తాయి. N, A, B, C, D, E ల నుంచి భూమధ్య రేఖకు సమాంతర రేఖలు గీయవలె. ఇట్లాగే భూమధ్యరేఖకు దక్షిణాన కూడా గీయండి. ప్రక్షేపము పూర్తి అయింది.


గణిత నిర్మాణక్రమము

$$\begin{aligned}\text{భూమధ్య రేఖయొక్క పొడవు} &= 2\pi R \\ &= \frac{2 \times 22 \times 1}{7} = 6.28 \text{ అం.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{రేఖాంశాల మధ్యాంతర దూరము} &= 2\pi R \times \frac{\text{ప్రక్షేప మధ్యాంతరము}}{360} \\ &= 6.28 \times \frac{15}{360} \text{ అం.} \\ &= 0.26 \text{ అం.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{భూమధ్యరేఖ నుంచి } 15^\circ \text{ల అక్షాంశదూరము} &= R \sin 15^\circ = 0.258 \text{ అం.} \\ \text{" } 30^\circ \text{ " } &= R \sin 30^\circ = 0.5 \text{ అం.} \\ \text{" } 45^\circ \text{ " } &= R \sin 45^\circ = 0.707 \text{ అం.}\end{aligned}$$

“	60°	“	= R సెన్. 60° = 0.860 అం.
“	75°	“	= R సెన్. 75° = 0.965 అం.
“	ధ్రువం యొక్క దూరము = R సెన్. 90° = 1 అం.		



స్కేల్ 1:250,000,000

పటము-28: స్థూపాకార సమక్షేత్ర ప్రక్షేపము

పై విలువల సహాయంతో ప్రక్షేపాన్ని గీయవచ్చు.
అక్షకాలు

1. అక్షాంశరేఖాంశాలు సరళరేఖలుగా ఉంటాయి. ఇవి సమకోణాలు చేస్తూ ఒకదాన్నొకటి ఖండించుకొంటాయి.
2. ఈ ప్రక్షేపము సమక్షేత్రంగా ఉంటుంది.

3. భూమధ్యరేఖనుంచి ధ్రువాలవై పు వెళ్ళేకొద్దీ అక్షాంశాల మధ్యాంతరం తగ్గుతూ ఉంటుంది.

4. అక్షాంశాల పొడవులు భూమధ్యరేఖ పొడవుతో సమానంగా ఉంటాయి కనక భూమధ్యరేఖనుంచి ధ్రువాలవై పు వెళ్ళేకొద్దీ తూర్పు-పడమరల దూరాలు హెచ్చుతూ ఉంటాయి. కాని ఈ హెచ్చింపు ఉత్తర-దక్షిణ దూరాలలోని తగ్గింపు వల్ల పరిహరించ బడుతుంది. అందువల్ల ఇది సమక్షేత్ర ప్రక్షేపము.

5. భూమధ్యరేఖనుంచి దూరం వెళ్ళేకొద్దీ, ఆప్రాంతపు ఆకృతి తప్పుగా మార్పుచెంది చూపబడుతుంది.

ఉపయోగము

ఈ ప్రక్షేపము విస్తరణ విధానాలను బాగుగా చూపుతుంది. కాని ధ్రువ ప్రాంతపు అక్షాంశాలవద్ద ఎక్కువ స్కేల్ మార్పుచెంది ఉంటుంది కనక ఆప్రాంతాలలోని విస్తరణ సరిగా చూపబీలుగాదు. అందువల్ల భూమధ్యరేఖకు దగ్గరగా ఉన్న (45° ఉత్తర, దక్షిణ అక్షాంశాలలోపు ప్రాంతాలలోని) ప్రాంతాల విస్తరణ మాత్రం సరిగా చూపబీలవుతుంది.

10. మర్కేటర్ ప్రక్షేపము లేదా

స్తూపాకారపు యథాకృతిక ప్రక్షేపము

(Mercator's Projection or Cylindrical orthomorphic projection)

లెక్క : ప్రపంచ మానచిత్రాన్ని గీయడానికి $1:250,000,000$ స్కేల్ పై మర్కేటర్ ప్రక్షేపాన్ని గీయండి. మధ్యాంతరము 20° లు తీసుకోండి.

గ్రాఫిక్-నిర్మాణక్రమము

$$R = \frac{250,000,000}{250,000,000} \text{ అం.}$$

$$= 1 \text{ అం.}$$

$$\begin{aligned} \text{భూమధ్య రేఖపొడవు} &= 2\pi R \\ &= 2 \times 3.141 \times 1 \\ &= 6.282 \text{ అం.} \end{aligned}$$

6.282 అం.లు పొడవుగల ఒక సరళరేఖను అడ్డంగా గీయవలె. ఈ రేఖకు రెండువైపుల లంబరేఖలను గీయవలె. భూమధ్య రేఖను 18 రేఖాంశ భాగాలుగా విభజించవలె. ($\because \frac{360^{\circ}}{20^{\circ}} = 18$ భాగాలు). ఈ భాగాల గుండా లంబరేఖలు గీస్తే, రేఖాంశాలు వస్తాయి. అక్షాంశాలు గీయడానికి భూమధ్యరేఖనుంచి అక్షాంశరేఖల దూరం కావలె. ఆ దూరాలను ఈ కింది పట్టిక నుంచి లెక్కకట్టవచ్చు.

భూమధ్య రేఖ నుంచి 5° ల అక్షాంశ దూరము $0.087 \times R$ ($R =$ స్కేల్ ప్రకారం భూమి వ్యాసార్థము)

„	10°	„	$0.175 \times R$
„	15°	„	$0.265 \times R$

„	20°	„	0.356 × R
„	25°	„	0.450 × R
„	30°	„	0.549 × R
„	35°	„	0.652 × R
„	40°	„	0.763 × R
„	45°	„	0.880 × R
„	50°	„	1.011 × R
„	55°	„	1.153 × R
„	60°	„	1.317 × R
„	65°	„	1.505 × R
„	70°	„	1.736 × R
„	75°	„	2.025 × R
„	80°	„	2.437 × R
„	85°	„	3.132 × R

								80°								
								60°								
								40°								
								20°								
160°	120°	80°	40°	0°	40°	80°	120°	160°	చూ							
								20°								
								40°								
								60°								
								80°								

భూ.రే. పొడవు = $2\pi R$
 $2 \times 3.1416 \times 1$
 6.2832

స్కేల్. 1: 250,000,000

గణితీయ నిర్మాణక్రమము

$$R = \frac{250,000,000}{250,000,000} \\ = 1 \text{ అం.}$$

భూమధ్యరేఖ పొడవు $= 2\pi R$.

భూమధ్యరేఖనుంచి 20° ఉత్తర దక్షిణ అక్షాంశాలదూరము =

$$\begin{aligned} &= 2.3 \times R \times \text{సంవర్గమాన టాన్} \text{ Log. Tan } \left(45 + \frac{20^\circ}{2}\right) \\ \text{" } 40^\circ \text{ " } &= 2.3 \times R \times \text{సంవర్గమాన టాన్} \left(45 + \frac{40^\circ}{2}\right) \\ \text{" } 60^\circ \text{ " } &= 2.3 \times R \times \text{సంవర్గమాన టాన్} \left(45 + \frac{60^\circ}{2}\right) \\ \text{" } 80^\circ \text{ " } &= 2.3 \times R \times \text{సంవర్గమాన టాన్} \left(45 + \frac{80^\circ}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\text{రేఖాంశాల మధ్యాంతరము} = 2\pi R \times \frac{\text{ప్రతేప మధ్యాంతరము}}{360^\circ}$$

ఈ సూత్రాలను ఆధారంగా లెక్కబట్టి ప్రతేపాన్ని గీయవచ్చు.

లక్షణాలు

1. అక్షాంశరేఖాంశాలు సరళరేఖలుగా ఉంటాయి. అవి ఒకదానినొకటి నిమగ్నముగా చేసేటట్లుగా ఖండించుకొంటాయి.
2. రేఖాంశాలు సమమధ్యాంతరాలుగా ఉంటాయి.
3. అక్షాంశాలు భూమధ్యరేఖనుంచి ధ్రువాలవైపు వెళ్ళేకొద్దీ వాటి మధ్యాంతరము పెరుగుతూఉంటుంది.
4. రెండు ఖిందువులమధ్యదిశ సరిగా సూచింపబడి ఉంటుంది.
5. చిన్నచిన్న ప్రాంతాల ఆకృతి సరిగా ఉంటుంది. కాని అక్షాంశ విస్తరణ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఆకృతిలో విరూపత వస్తుంది.
6. భూమధ్యరేఖ మీది దూరాలు మాత్రం సరిగా ఉంటాయి.
7. విస్తీర్ణం మాత్రం ఎక్కువగా అతిశయించబడుతుంది.

ఉపయోగము

నౌకాయానానికి పనికివచ్చే నౌకామార్గాల మానచిత్రాలకు, సముద్ర ప్రవాహము, గాలులు చూపడానికి ఈ ప్రతేపము బాగా ఉపయోగపడుతుంది. భారతీయ దై నందిన వాతావరణ మానచిత్రాల (Indian daily weather maps) లో ఈ ప్రతేపాన్ని ఉపయోగిస్తారు.

11. మాల్విడ్ ప్రక్షేపము లేదా బాబినెట్ సమతల ప్రక్షేపము

(Mollweide projection or Babinet's equal-surface projection)

లెక్క : 1:125,000,000 స్కేల్ పై, ప్రక్షేప మధ్యాంతరము 15° లు తీసుకొని ప్రపంచ మానచిత్రాన్ని చూపడానికి మాల్విడ్ ప్రక్షేపాన్ని గీయండి.

నిర్మాణక్రమము

ఈ ప్రక్షేపంలో అక్షాంశాలతో ఆవరించిన దీర్ఘవృత్త (Ellipse) విస్తీర్ణము గ్లోబ్ విస్తీర్ణానికి సమానంగా ఉంటుంది. అందువల్ల దీర్ఘవృత్తంలోని సగభాగము గ్లోబ్ సగభాగానికి సరిపడవలె. ఇప్పుడు ప్రక్షేప దీర్ఘవృత్తము 90° ల వృత్తానికి రెట్టింపు విస్తీర్ణము ఉండేటట్లుగా గీయవలె.

$$\therefore \text{వృత్తవ్యాసార్థము } (r) = \sqrt{2R}$$

$$R = \frac{250,000,000}{125,000,000} \text{ అం.}$$

$$= 2 \text{ అం.}$$

$$r = 1.414 \times 2 = 2.828 \text{ అం.}$$

2.828 అం. ల వ్యాసార్థంతో ఒకవృత్తాన్ని గీయవలె. దానిలో భూమధ్య రేఖ, అక్షవ్యాసాలను గీయవలె. ఇప్పుడు భూమధ్యరేఖ వ్యాసాన్ని రెండు వైపులకు వ్యాసార్థంపొడవులకు సమానంగా పొడగించవలె. అంటే భూమధ్య రేఖ మొత్తంపొడవు వృత్తవ్యాసార్థానికి నాలుగురెట్లు ఉంటుంది. అక్షవ్యాసము మధ్యరేఖాంశము అవుతుంది. ఇప్పుడు అక్షాంశ రేఖాంశాల మధ్యాంతరాలు ఈ క్రిందిపట్టికద్వారా తెలుసుకొని అక్షాంశాలను సరళరేఖలుగా రేఖాంశాలను సైన్ వక్రాలు (Sine curves) గా కలుపుతూ గీయవలె. తరువాత అక్షాంశ రేఖాంశాలడిగ్రీలు గుర్తించి ప్రక్షేపాన్ని పూర్తిచేయవలె.

భూమధ్యరేఖనుంచి అక్షాంశాల దూరాలను తెలిపేపట్టిక

అక్షాంశము భూమధ్యరేఖనుంచి దూరము.

5°	$0.0685 \times r$	లేదా	$0.970 \times R$
10°	$0.1368 \times r$	„	$0.1936 \times R$
15°	$0.2047 \times r$	„	$0.2896 \times R$
20°	$0.2720 \times r$	„	$0.3846 \times R$
25°	$0.3385 \times r$	„	$0.4787 \times R$
30°	$0.4040 \times r$	„	$0.5714 \times R$
35°	$0.4682 \times r$	„	$0.6621 \times R$
40°	$0.5310 \times r$	„	$0.7508 \times R$
45°	$0.5920 \times r$	„	$0.8372 \times R$
50°	$0.6512 \times r$	„	$0.9209 \times R$

55°	0.7080 × r	„	1.0014 × R
60°	0.7624 × r	„	1.0783 × R
65°	0.8138 × r	„	1.1508 × R
70°	0.8619 × r	„	0.2189 × R
75°	0.9061 × r	„	1.2814 × R
80°	0.9454 × r	„	1.3370 × R
85°	0.9784 × r	„	1.3835 × R
90°	1.000 × r	„	1.4142 × R

r = నూల్విడ్ ప్రక్షేప వృత్తవ్యాసార్థము

R = స్కేల్ ప్రకారం తగ్గించిన భూమివ్యాసార్థము.


అక్షాంశాలమీది రేఖాంశాల మధ్యాంతరం తెలిపేపట్టిక

అక్షాంశాలు	మధ్యాంతరము	అక్షాంశాలు	మధ్యాంతరము
5°	0.9977 × భూ. మ.	50°	0.7589 × భూ. మ.
10°	0.9906 × „	55°	0.7062 × „
15°	0.9788 × „	60°	0.6471 × „
20°	0.9623 × „	65°	0.5811 × „
25°	0.9410 × „	70°	0.5071 × „
30°	0.9148 × „	75°	0.4232 × „
35°	0.8836 × „	80°	0.3259 × „
40°	0.8474 × „	85°	0.2068 × „
45°	0.8059 × „	90°	0.0000 × „

భూ. మ. = భూమధ్య రేఖమీది మధ్యాంతరము.

లక్షణాలు

1. అక్షాంశాలు భూమధ్యరేఖకు సమాంతరంగా ఉన్న సరళరేఖలు.
2. అక్షాంశాల మధ్యాంతరము భూమధ్యరేఖనుంచి ద్రువాలవైపు వెళ్ళే కొద్దీ తగ్గుతూ ఉంటుంది.
3. మధ్యరేఖాంశం మాత్రం ఒక నిలువు రేఖగా ఉంటుంది. మిగిలిన రేఖాంశాలన్నీ దీర్ఘవృత్తాలు. 90° తూర్పు, పడమర రేఖాంశాలు రెండూ కలిసి ఒక వృత్తంగా ఉంటాయి.
4. ఇది సమక్షేత్ర ప్రక్షేపము.
5. రేఖాంశాలమీది స్కేల్ మధ్యరేఖాంశం నుంచి దూరం వెళ్ళేకొద్దీ పొచ్చుతూ ఉంటుంది.



ఉపయోగము

ఇది సమక్షేత్ర ప్రక్షేపం కావడంవల్ల, ఈ ప్రక్షేపాన్ని ముఖ్యంగా వస్తువుల యొక్కగాని, జనాభాయొక్కగాని విస్తరణ చూపడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ ప్రక్షేపంలో ప్రపంచాన్నంతటినీ సైన్యసోయడల్ ప్రక్షేపంలో కన్న బాగా చూపవచ్చు.

12. మర్కేటర్ - శాంసన్ - ఫ్లామ్స్టీడ్ లేదా సైన్యసోయడల్ ప్రక్షేపము (Mercator - Sanson - Flamsteed or sinusoidal projection)

లెక్క : ప్రపంచ మానచిత్రాన్ని 1:125,000,000 స్కేల్ పై గీయడానికి సైన్యసోయడల్ ప్రక్షేపాన్ని గీయండి. ప్రక్షేపమధ్యాంతరము 15° లు.

గ్రాఫిక్ - నిర్మాణక్రమము


$$\text{స్కేల్ ప్రకారం } R = \frac{250,000,000}{125,000,000} \text{ అం.} = 2 \text{ అం.}$$

$$\text{భూమధ్యరేఖ పొడవు} = 2\pi R$$

$$= 2 \times 3.141 \times 2 \text{ అం.} = 12.564 \text{ అం.}$$

2 అం. వ్యాసార్థంతో ఒక వృత్తాన్ని గీయవలె. ON భూమి అక్షవ్యాసార్థాన్ని, EOA భూమధ్యరేఖ వ్యాసాన్ని గీయవలె. 'O' కేంద్రంవద్ద $15^{\circ}, 30^{\circ}, 45^{\circ}, 60^{\circ}, 75^{\circ}$ ల కోణాలు చేయవలె. ప్రక్షేప మధ్యాంతరమైన 15° ల కోణము వృత్త పరిధి మీద చేసిన AB చాప దూరము వ్యాసార్థంగా తీసుకొని 'O' కేంద్రంగా ఒక అర్ధవృత్తాన్ని గీయవలె. ఈ అర్ధవృత్తము అక్షాంశ కోణాలను ఖండించిన చోట నుంచి ON భూమి అక్షం వరకు భూమధ్యరేఖకు సమాంతరరేఖలు గీయవలె. ఈ సమాంతరరేఖల పొడవులే ఆయా అక్షాంశాల మీది మధ్యాంతర దూరాలు.

ఇప్పుడు 12.56 అం.ల పొడవు ఉన్న సరళరేఖను భూమధ్యరేఖగా గీయవలె. దీనిలో సగము ఉండేటట్లు, ఈ రేఖకు లంబంగా ఉండేటట్లు మధ్యరేఖాంశాన్ని గీయవలె. ప్రక్షేప మధ్యాంతరము 15° లు కాబట్టి భూమధ్య రేఖను 24 సమభాగాలుగాను, మధ్యరేఖాంశాన్ని 12 సమభాగాలుగాను చేయవలె. మధ్యరేఖాంశం మీది భాగాలగుండా భూమధ్యరేఖకు సమాంతరరేఖలు గీయవలె. ఇవి అక్షాంశాలు. అర్ధవృత్తంలోని సమాంతర రేఖల దూరాలతో ఆయా అక్షాంశాల మీద రెండు పక్కల సమానంగా 24 భాగాలు చేయవలె. ఈ భాగాలను అన్నింటినీ మృదు వక్రాలు (Smooth curves) గా కలుపుతూ రేఖాంశాలను పూర్తి చేయవలె. ఇప్పుడు అక్షాంశ రేఖాంశాల డిగ్రీలను గుర్తించవలె. ఇప్పుడు ప్రక్షేపము పూర్తి అయింది.



పటము - 29: మర్కేటర్ - శాంసన్ పామ్ప్లిడ్ లేదా నై మ్యూనియన్ ప్రక్షేపము

గణితీయ నిర్మాణక్రమము

భూమధ్యరేఖ పొడవు = $2\pi R$

మధ్యరేఖాంశంపొడవు = πR

భూమధ్య రేఖమీది మధ్యాంతరము(x) = $2\pi R \cdot \frac{\text{ప్ర.మ}}{360}$

మిగిలిన అక్షాంశాల మీది మధ్యాంతరము = $x \times \text{కొనైన}^{\circ}$. అక్షాంశము.
లక్షణాలు

1. భూమధ్యరేఖ ప్రామాణిక-అక్షాంశంగా ఉంటుంది. అది సరిగా గీసిన ఒక సరళరేఖ.
2. మిగిలిన అక్షాంశాలుకూడా భూమధ్య రేఖవలెనే సరళరేఖలు.
3. అక్షాంశాలు సమాన మధ్యాంతరాలలో ఉంటాయి. వాటిమీది మధ్యాంతరాలు సరిగా విభజింపబడి ఉంటాయి.
4. మధ్యరేఖాంశం తప్పించి మిగిలిన రేఖాంశాలన్నీ సైన్ మధ్యరేఖాంశము భూమధ్యరేఖకు లంబంగా ఉన్న సరళరేఖ. మధ్యాంతరం కూడా స్కేల్ సరిగా ఉంటుంది.
5. అన్ని అక్షాంశాల మీది స్కేల్ సరిఅయినది.
6. ఇది సనుక్షేత్ర ప్రక్షేపము

ఉపయోగము

ఇది గణాంక వివరాలను చూపడానికి బాగా ఉపయోగపడే భూమధ్యరేఖాప్రాతంలోను, మధ్య అక్షాంశాల ప్రాతంలోను వ్యాపించి ఆఫ్రికా, దక్షిణ అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా మొదలైన దేశాలు చూపడానికి ఉపయోగిస్తుంది.


13. హోమోలోగ్రాఫిక్ లేదా విచ్ఛిన్న మాల్విడ్ ప్రక్షేపం (Homolographic or Interrupted Mollweide Projection)

లెక్క : ఖండాలను చూపడానికి 1:125,000,000 స్కేలుపై, ప్రక్షేపమధ్యాంతరంతో విచ్ఛిన్న మాల్విడ్ ప్రక్షేపం గీయండి.

నిర్మాణక్రమము

ఖండాలకు మధ్యగా ఉన్న రేఖాంశాలను మధ్యరేఖాంశం ఎన్నుకోవాలి. అవి :—

ఉత్తరఅమెరికాకు	100° ప. రేఖాంశము.
దక్షిణ అమెరికాకు	55° ప. రేఖాంశము.
యూరేషియాకు	80° తూ. రేఖాంశము.
ఆఫ్రికాకు	20° తూ. రేఖాంశము.
ఆస్ట్రేలియాకు	140° తూ. రేఖాంశము.



పటము-30 : పోలార్ గ్రాఫిక్ లేదా విచ్చిన్న మాల్టిడ్ ప్రక్షేపము

ఉత్తరార్ధగోళంలో 40° ప. రేఖాంశంవద్ద దక్షిణార్ధగోళంలో 10° ప., 50° తూ. రేఖాంశాలవద్ద విచ్ఛిన్నం (Interruption) చేయవలె.

$$\text{స్కేల్ ప్రకారం గ్లోబ్ వ్యాసార్థము} = \frac{250,000,000}{125,000,000} = 2 \text{ అం.}$$

$$\begin{aligned} \text{భూమధ్యరేఖ పొడవు} &= 4r \sqrt{2} \\ &= 8 \times 1.414 = 11.312 \text{ అం} \end{aligned}$$

$$\text{భూమధ్యరేఖమీది మధ్యాంతరము} = \frac{11.312}{24} = 0.471 \text{ అం.}$$

మధ్యరేఖాంశాలమీది, అక్షాంశాలమీది మధ్యాంతరాలు మాల్విడ్ ప్రక్షేపంలోవలె పట్టిక సాయంతో లెక్కకట్టవలె.

11.312 అం.ల పొడవుతో భూమధ్యరేఖను గీసి, దానిపై 24 సమభాగాలు చేయవలె. మధ్యరేఖాంశాలుగా ఎన్నిక చేసుకొన్నవాటిపై లంబరేఖలు గీసి, వాటిపై అక్షాంశ విభాగాలను చేసి అక్షాంశాలను విచ్ఛిన్నత ఉన్న వరకు మాత్రమే గీయవలె. అక్షాంశాలమీద రేఖాంశాల విభాగాలను కూడా చేసి వాటిని మృదు వక్రాలుగా కలుపుతూ రేఖాంశాలను గీయవలె.

ఉపయోగము

ఈ ప్రక్షేపంలో ఎక్కువ మధ్యరేఖాంశాలుగా తీసుకోవడంవల్ల, ఆ రేఖాంశాల వద్ద స్కేలు సరిగా ఉంటుంది. ఇట్లా చేయడంవల్ల, మాల్విడ్ ప్రక్షేపంలోని వృత్తానికి బయటకు అంటే దీర్ఘవృత్తంలోకి వెళ్ళేకొద్దీ వచ్చే విరూపతను ఈ ప్రక్షేపంలో రాకుండా చేయవచ్చు. దీనిలో మనకు కావలసిన ప్రాంతాలను, అవసరం లేని ప్రాంతాలను పూర్తిగా వదలివేయడంవల్ల బాగా చూపవచ్చు.

14. విచ్ఛిన్న సైన్యసోయ్ డల్ ప్రక్షేపము

(Interrupted sinusoidal projection)

లెక్క : 1:166,666,666 స్కేల్ పై, 15° లు ప్ర.మ.తో ఖండాలను చిత్రించడానికి విచ్ఛిన్న సైన్యసోయ్ డల్ ప్రక్షేపాన్ని గీయండి.

నిర్మాణక్రమము

ముందుగా ఒక్కొక్క ఖండానికి మధ్యరేఖాంశాలను ఎన్నిక చేసుకోవలె. తరువాత సముద్రభాగాలలో విచ్ఛిన్నం చేయవలసిన రేఖాంశాలను కూడా ఎన్నిక చేసుకోవలె. వాటిని కింది విధంగా ఎన్నిక చేసుకోవలె.

ఉత్తర అమెరికాకు	మధ్య రేఖాంశము	100° ప.	రేఖాంశము
యూరేషియాకు	„	80° తూ.	రేఖాంశము
ద. అమెరికాకు	„	55° ప.	„
ఆఫ్రికాకు	„	20° తూ.	„
ఆస్ట్రేలియాకు	„	140° తూ.	„

ఉత్తరార్ధ గోళంలో విచ్చిన్నం చేయవలసిన రేఖాంశము 40°ప.

దక్షిణార్ధగోళంలో విచ్చిన్నం చేయవలసిన రేఖాంశాలు 10°ప., 80°తూ.

$$R = \frac{250,000,000}{166,666,666} \text{ అం.}$$

$$= 1.5 \text{ అం.}$$

$$\text{భూమధ్యరేఖ పొడవు} = 2\pi R$$

$$= 2 \times 3.141 \times 1.5 = 9.423 \text{ అం.}$$

9.423 అం. ల ఒక అడ్డరేఖను గీయవలె. ఆ రేఖను 24 సమభాగాలు చేసి రేఖాంశాలను గుర్తించవలె. వాటిలో ఖండాల మధ్యరేఖాంశాలను గీసి, విచ్చిన్నం చేయవలసిన రేఖాంశాలను గుర్తించుకోవలె. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని మిగిలిన ప్రక్షేపాన్ని అంతా మామూలు సైన్యసోయ్డల్ ప్రక్షేపం వలెనే చేయవలె.

ఉపయోగము

ఈ ప్రక్షేపంలో మనకు కావలసిన ప్రాంతాలగుండా మధ్యరేఖాంశాలను ఎన్నిక చేసుకొని, అవసరంలేని ప్రాంతలలో విచ్చిన్నంచేయవచ్చు. దీనిలో ఎక్కువ మధ్యరేఖాంశాలను స్కేల్ కు సరిగా గీయడంవల్ల కొన్ని అనుకొన్న ప్రాంతాలు వికృతాకారాలు కాకుండా చేయవచ్చు.

అభ్యాసము


1. ఏదై నా ఒక అట్లాస్ (Atlas) తీసుకొని, దానిలోని ఏయే ప్రాంతాలకు, ఏయే ప్రక్షేపాలు ఉపయోగించి ఉన్నవో, వాటిలో చూపిన వివరాలు మొదలై న వాటిని ఒక పట్టికరూపంలో తయారుచేసి, స్కేల్, వివరణ; ఉపయోగించిన ప్రక్షేపము, వీటికిగల సంబంధాన్ని వివరించండి.

2. కిందివాటిని చూపడానికి ఏయే ప్రక్షేపాలను ఉపయోగిస్తారో వివరించండి, అవే ప్రక్షేపాలను ఎన్నుకోవడానికి కారణాలు వ్రాయండి.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. ప్రపంచంలో వరిఉత్పత్తి. | 2. ఆసియాలో ఆహారపంటల ఉత్పత్తి. |
| 3. ప్రపంచ జనాభావిస్తరణ. | 4. ప్రపంచంలో గోధుమ విస్తరణ. |
| 5. ట్రాన్స్-సైబీరియన్ రైలు మార్గము. | 6. అట్లాంటిక్; పసిఫిక్ సముద్ర పవనాలు, సముద్రప్రవాహాలు. |
| 7. భారత-పాకిస్తాన్ సరిహద్దు. | 8. భారతదేశము. |
| 9. చెనా. | 10. ఐరోపాఖండము. |
| 11. అంతర్జాతీయ విమానమార్గాలు. | |

3. కిందిప్రాంతాలను చూపడానికి మీ ఇష్టంవచ్చిన స్కేల్ తీసికొని, 15° ల ప్రక్షేపమధ్యాంతరంతో ప్రక్షేపాలనుగీసి వాటిని రూపాంతరము వ్రాయండి.

1. ఒక ప్రామాణిక-అక్షాంశ శాంకవీయ ప్రక్షేపంమీద వాయవ్య ఐరోపా.
(Conical projection with one standard-parallel)



2. స్తూపాకార సమతేత్ర ప్రక్షేపంమీద ప్రపంచము (World on cylindrical equal area).

3. 45° నుంచి ధ్రువంవరకు, ధ్రువశీర్ష సమదూర ప్రక్షేపంమీద ఉత్త రార్ధగోళము (Northern hemisphere from 45° N to the pole on the polar zenithal equi-distant).

4. శాన్సన్ ఫ్లామ్ స్టెడ్ ప్రక్షేపంమీద దక్షిణఅమెరికా (South America on Sanson Flamstead projection).

5. బోన్ ప్రక్షేపంమీద ఆసియా (Asia on bonne's projection).

6. రెండుప్రామాణిక-అక్షాంశాల శాంకవియ ప్రక్షేపంమీద ఐరోపా (Europe on conical with two-st. parallels).

బ్లాక్ చిత్రాలు

(BLOCK DIAGRAMS)

బ్లాక్ చిత్రాలను ప్రప్రథమంగా గ్రోన్ కారల్ గిల్బర్ట్ అనే మహాశయుడు కనిపెట్టినాడు. ప్రఖ్యాత భూస్వరూప శాస్త్రవేత్త విలియమ్ మోరిస్ డేవిస్ వాటిని పూర్తిగా సవరించి బాగా ఉపయోగించినాడు. ప్రస్తుతము ఇవి చాలా వాడుకలో ఉన్నాయి. భూమి మీది కొంత భాగాన్ని ముక్కగా గ్రహించి, దానిని కొంత దూరంచుంచి చూస్తే కనిపించే దృక్పథం (Perspective) లో చిత్రించడమే బ్లాక్ చిత్రం గీయడంలోని ఉద్దేశము. బ్లాక్ ఉపరితలం మీద భూదృశ్యం (Landscape), పక్కలలో భౌమ పార్శ్వ రేఖా చిత్రాలు (Geological sections) చూపబడుతాయి. బ్లాక్ చిత్రాలు పొడవు, వెడల్పులే కాకుండా, లోతూ, ఎత్తులను కూడా చూపే త్రిపరిమాణాత్మక చిత్రాలు (Three dimensional diagrams). కాబట్టి, నిమోన్నతాలను స్పష్టంగా చిత్రించే పద్ధతులలో ఇవి అసమానమైనవి.


బ్లాక్ చిత్రాలు గీయడం ద్వారా ఒక ప్రాంతంలోని స్థలాకృతికి భౌమ నిర్మాణ స్థితికి ఉన్న సంబంధాన్ని విశదంగా చూపవచ్చు. ఉదాహరణకు 32 వ పటం చూడండి. భూ స్వరూపాల పరిణామాన్ని కూడా వరసగా, బ్లాక్ చిత్రాల ద్వారా, ఎక్కువ వర్ణన అవసరంలేకుండానే వ్యక్తపరచవచ్చు.

బ్లాక్ చిత్రాన్ని మూడుదశలలో తయారు చేయవలె.

1. బ్లాక్ చిత్రం గీయడానికి ఆధారమైన బ్లాక్ ను ఏక బిందు-దృక్పథంలో (One-point perspective) గాని, ద్విబిందు-దృక్పథం (Two-point perspective) లో గాని గీయడం.
2. భూ అంతర్భాగ సంబంధమైన పొరల వివరాలను, వాటి నిర్మాణాన్ని బ్లాక్ పక్క భాగాలకు మార్చడం.
3. బ్లాక్ ఉపరితలం మీద భూదృశ్య వివరాలను చిత్రించడం.


దృక్పథ బ్లాక్ లు గీసేవిధము

దృక్పథంలో బ్లాక్: ఈ పద్ధతి బ్లాక్ లో పరిశీలకునికి కనిపించే ముందుభాగము ఒక ఊతిజ సమాంతరరేఖగాను, వెనక ఉన్న అంచుకు సమాంతరంగానూ ఉండి, ఒక నలుచదరంగా ఉంటుంది. బ్లాక్ పక్క రెండు అంచులూ, పటంలోని రేఖలూ, దిక్పథం (Horizon) లోని సుదూరమైన అదృశ్య బిందువు (Vanishing point) వైపు కలిసిపోతాయి. ఈ పద్ధతిలో గీసిన బ్లాక్ ను పరిశీలకుని వైపు (33, a, b, c వ పటంలో చూపినట్లుగా) పలువిధాలుగా అమర్చవచ్చు. మనకు బ్లాక్ ముందు



పటము-32 : బ్లాక్ చిత్రము


అదృశ్య చిందువు



పటము-33 : ఏకచిందు దృశ్యరేఖలలో గీసిన బ్లాక్ చిత్రాలు

భాగపు అంచు కనిపించేటట్లు అమర్చితే, అదొక్కటి మాత్రమే కనిపించి, మిగిలిన రెండు పక్కల అంచులు కానరావు. లేదా కుడివైపు పక్క అంచుగాని, ఎడమ వైపు పక్క అంచుగాని మన వైపు అమర్చవచ్చు. ఇట్లా బ్లాక్ ను ఉంచినపుడు, ముందు అంచు ఒకటి, రెండు పక్కలంచులతో ఒకటి (కుడివైపు అంచుగాని, ఎడమవైపు అంచుగాని) మాత్రమే కనిపిస్తాయి.

33వ పటంలోని AB రేఖకు AE రేఖకు మధ్య ఉన్న కోణాన్ని బట్టి బ్లాక్ తిర్యక్త్వం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ కోణము సుమారు 45° లు ఉంటే మంచిది. 33 (a)వ పటంలోని అదృశ్య బిందువు H స్థానాన్ని బట్టి పక్కలంచు వెడల్పు తగ్గుతుంది. H బిందువును ఎక్కువ కుడివైపుగాని, ఎక్కువ ఎడమవైపుగానీ ఉంచితే, పక్కలంచుపై భూ అంతర్భాగ వివరాలను చూపడానికి సరిపడే వెడల్పు ఉంటుంది. అట్లాకాక H బిందువును మధ్యగా ఉంచితే రెండు పక్కల అంచులు పూర్తిగా కనపడక పోవడంగాని, వాటి వెడల్పు మరీతక్కువగా ఉండడంగాని జరుగుతుంది. అప్పుడు పక్కలంచులమీద భూ అంతర్భాగ వివరాలు చూపడానికి వీలుకాదు.




పటము-34 : ద్విబిందు దృక్పథంలో గీసిన బ్లాక్ చిత్రాలు

ద్విబిందు దృక్పథ బ్లాక్ లు: ఈ పద్ధతిలో గీసిన బ్లాక్ లు పరిశీలకునికి ఒక మూల నుంచి కనిపిస్తాయి. అంటే మనకు ముందుభాగంలో బ్లాక్ మూల ఒకటి ఉండి రెండువైపులకు రెండు పక్కల అంచులు కనిపిస్తాయి. ముందు కనిపించే ఒక మూలకు సరిగా ఆవలివైపు మరొక మూల ఉంటుంది. ఈ బ్లాక్ పక్కల అంచులు పొడిగిస్తే, దిక్చక్రంలోని కుడి ఎడమవైపుల సుదూరంలో ఉన్న అదృశ్య బిందువుల వైపు



కలిసిపోతాయి. వీటిని కూడా 34వ పటంలో చూపిన మాదిరి పలురకాలుగా అమర్చవచ్చు.

భౌమనిర్మాణ వివరాలను బ్లాక్ పక్కభాగాలకు మార్చడం

భౌమ నిర్మాణాన్ని బ్లాక్ పక్కభాగాలకు దృక్పథంలో చూచినట్లుగా 35వ పటంలో చూపినవిధంగా మార్చవలె. అడ్డంగా ఉన్న భూఅంతరాళిగపు పొరలను బ్లాక్ పక్కలకు దృక్పథంలో చూపేటప్పుడు వాచీవెడల్పు అదృశ్య బిందువువైపు వెళ్ళేకొద్దీ సన్నమవుతూ ఉంటుంది. AB భౌమచ్ఛేదము (Geolo-



పటము-35: భౌమచ్ఛేదాన్ని బ్లాక్ పక్కభాగాలకు, దృక్పథంలో చూచినట్లు మార్చడం



పటము-36: దృక్పథంలో ప్రక్షేపము

Hical section) BC భౌమచ్ఛేదము ఒకేవరుసలో ఉన్నట్లుచూపవలె. AB భాగము A'B' గా, BC భాగము B'C' గా 35 వ పటంలో చూపినారు.


బ్లాక్ ఉపరితలంపై భూదృశ్య వివరాలను గుర్తించడం

బ్లాక్ పైన భూదృశ్య వివరాలను కూర్చేటప్పుడు కూడాదృక్పథ సూత్రాన్ని పట్టేయవలె. అవస్థానికకారం ఉపరితల గ్రిడ్ ప్లాన్ (Grid plan) ను దృక్పథంలో చూసేట్లు గీయడం తిరిగి A పటంలో, చక్కభాగాన్ని మార్చడం తిరిగి B పటంలో చూపించింది.


భూకృతి చూసేటటంలోని వివరాలను బ్లాక్ ఉపరితలానికి మార్చడం రేఖాకృతిగా చేయవచ్చు.

1. బహుళచ్ఛేద పద్ధతి (Multiple section method).


ముందుగా సమోన్నత రేఖాపటంపై గ్రిడ్ రేఖలతో ఒక ప్లాన్ గీసుకోవలె. గ్రిడ్ రేఖలమీద, పటమునాలుగు అంచులమీద ఉన్న సమోన్నత రేఖలను ఖండించే రేఖలను గీస్తూ, వ్యతీర్ణతలు, చదులు మొదలయినవాటిని గుర్తించుకోవలె. ఇది మామూలు పార్శ్వరేఖాకృతి గీసేట్లుగానే చేయవలె. పార్శ్వరేఖాకృతి గీసేవిధము తిరిగి అధ్యాయంలో చూపించింది.




1



3






పటము-37:



పటము-37: సమోన్నత రేఖాపటం పొడవు, వెడల్పులతో ఒక సమచతుర్భుజం (Rhombus) గీయవలె. సమచతుర్భుజ ఆధారరేఖపై చక్కరేఖలు సుమారు 45° ల కోణంపై నట్లు గీయవలె. రోంబస్ మీదకూడా గ్రిడ్ రేఖలు గీసుకొని, బ్లాక్ మీద వివరాలను రోంబస్ లోని రేఖలమీదికి మార్చవలె.

రోంబస్ మీద వివరాలను బ్లాక్ మీదికి గ్రిడ్ రేఖలను వదలి మిగిలిన పార్శ్వరేఖాకృతి భాగాలను మార్చవలె. అట్లాచేసేటప్పుడు పార్శ్వరేఖాకృతిలో



చూపని మరుగు భూమి మొదలై న ఇతర ముఖ్య వివరాలు కూడా మార్చవలె. బ్లాక్ పక్క అంచులను ఛాయ (Shade) చేసి, ఉపరితలం మీది వివరాలను పటాలలో చూపిన ఆధార చిత్రాల సహాయంతో బ్లాక్ చిత్రాన్ని పూర్తి చేయవలె.

2. పొరల పద్ధతి (Layer method)

పటంలోని వివరాలను రోంబస్ మీదికి గ్రిడ్ రేఖలను ఆధారంగా జేసుకొని మార్చిన తరువాత ఒక ఆభాస దృక్పథ దృష్టి (Pseudo - Perspective view) ఏర్పడుతుంది. వీలైన ఊర్ధ్వ స్కేల్ ను కొంత అతిశయంతో గీయవలె. రోంబస్ ను ఒక ఉల్లిపొర-కాగితం మీద గీసుకొని దాని మూలలనుంచి స్కేల్ ప్రకారం కిందికి లంబరేఖలు గీయవలె. ఈ ఉల్లి పొర-కాగితాన్ని ఆభాస దృక్పథ దృష్టిపై సరిగా నలుమూలలు సరిపడే టట్టుంచి, ఊర్ధ్వ స్కేల్ పై ఉల్లిపొర-కాగితాన్ని సమోన్నత రేఖల విలువల ప్రకారం జరుపుతూ, ఆయా సమోన్నత రేఖలను ఉల్లిపొర కాగితంమీదికి మార్చవలె. అట్లా గీసే టప్పుడు ఎక్కువ విలువ ఉన్న సమోన్నత రేఖ, తక్కువ విలువ ఉన్న సమోన్నత రేఖపై గీయవలసి ఉంటే తక్కువ విలువగల సమోన్నత రేఖనుగీసే అవసరము ఉండదు. ఎందువల్లనంటే చూడడానికి దృక్పథ దృష్టి కానరాదు. మిగిలిన వివరాలను కూడావాటి ఎత్తు

లలో గుర్తించి బహుళ చేదం (Multiple Section) లో వలెనే మిగిలిన బ్లాక్ చిత్రాన్ని తిరిగి పటంలో మాదిరి పూర్తి చేయవలె.

అనుబంధము 1 (APPENDIX I)

కొన్ని ముఖ్యసూత్రాలు

వృత్త వైశాల్యము

$$\pi r^2$$

గోళము వైశాల్యము

$$4\pi r^2$$

దీర్ఘవృత్త వైశాల్యము

$$\pi ab$$

వృత్తపరిధి

$$2\pi r \quad (\pi = 3.141593)$$

భూమధ్యరేఖాపరిధి

$$24899 \text{ స్టాట్యూట్ మైళ్ళు (Statute) లేదా} \\ 40075 \text{ కి. మీ.}$$

భూవైశాల్యము

$$\text{సుమారు } 19,72,60,000 \text{ చ. మై. లేదా} \\ 51,09,00,000 \text{ చ. కి. మీ.}$$

ఒక స్టాట్యూట్ మైలుకు

$$5,280.0 \text{ అడుగులు లేదా } 6,3360.0 \text{ అం.}$$

ఒక నాటికల్ (nautical) మైలుకు

$$1.1508 \text{ స్టాట్యూట్ మైళ్ళు.}$$

ఒక అంగుళానికి

$$2.540 \text{ సెం. మీ. లు.}$$

ఒక స్టాట్యూట్ మైలుకు

$$1.60935 \text{ కి. మీ. లు.}$$

ఒక కి. మీ. కు


$$3280.83 \text{ అడుగులు.}$$

ఒక చ. స్టాట్యూట్ మైలుకు

$$2.590 \text{ చ. కి. మీ. లు.}$$

అనుబంధము 2 (APPENDIX II)

ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలోని లఘుకోణ - త్రికోణమితియ ప్రమేయాలు



పటము - 39.

$$\begin{aligned}
 \text{సైన్ } \theta &= \frac{\text{ఎదుటిభుజము}}{\text{కర్ణము}} = \frac{AB}{AC} \\
 \text{కొసైన్ } \theta &= \frac{\text{ఆసన్నభుజము}}{\text{కర్ణము}} = \frac{BC}{AC} \\
 \text{టాన్ } \theta &= \frac{\text{సైన్ } \theta}{\text{కొసైన్ } \theta} = \frac{AB}{BC} = \frac{\text{ఎదుటిభుజము}}{\text{ఆసన్నభుజము}} \\
 \text{కాట్ } \theta &= \frac{1}{\text{టాన్ } \theta} = \frac{\text{ఆసన్నభుజము}}{\text{ఎదుటిభుజము}} = \frac{BC}{AB} \\
 \text{సీకంట్ } \theta &= \frac{1}{\text{కాట్ } \theta} = \frac{\text{కర్ణము}}{\text{ఆసన్నభుజము}} = \frac{AC}{BC} \\
 \text{కొసికంట్ } \theta &= \frac{1}{\text{సైన్ } \theta} = \frac{\text{కర్ణము}}{\text{ఎదుటిభుజము}} = \frac{AC}{AB}
 \end{aligned}$$

పారిభాషిక పదకోశము

ఇంగ్లీషు - తెలుగు

Appendix అనుబంధము	Horizontal షి తిజ సమాంతర
Area వైశాల్యము	Horizon దిక్చక్రము
Atlas అట్లాస్	Hypsometric colouring ఉచ్చతాదర్శి
Azimuthal దిగంశీయ	Interpolation అంతర్వేశనము వర్ణము
Bench mark బెంచ్ గుర్తు	Interval మధ్యాంతరము
Block diagram బ్లాక్ చిత్రము	Interrupted విచ్ఛిన్న
Cascade నెలయేరు	Irregular క్రమరహిత
Central meridian మధ్య రేఖాంశము	Lab manual ప్రయోగ దీపిక
Cirque హిమగర్తము	Landscape భూదృశ్యము
Cliff ఖగ్గుపు	Layer పొర
Coastal plain తీర మైదానము	Line of sight దృష్టిరేఖ
Coincide ఏకీభవించు	Map మానచిత్రము
Comparative scale తులనాత్మక స్కేల్	Mathematical గణితీయ
Composite సంయుక్త	Measuring unit మాపక ఏకాంకము
Conic / conical శాంకవీయ	Method of drawing లేఖన పద్ధతి
Conformal సదృశ	Military operation మిలిటరీ ఆపరేషన్
Contour lines సమోన్నత రేఖలు	Moraine మొరైన్
Conventional సాంప్రదాయక	Multiple బహుళ
Coordinates నిర్దేశాంకాలు	Nautical నాటికల్
Cylindrical స్తూపాకార	Northings నార్త్ లింగ్స్
Datum plane ఆధార తలము	Offsets అతంతలంబాలు
Dead ground మరుగు భూమి	Open divided scale విచ్ఛత విభజిత స్కేల్
Diagram చిత్రము	Opisometer పట మాపకము
Dial డయల్	Original మూల, మౌలిక
Dissected ఛేదిత	Orthomorphic యథావృత్తిక
Divisions భాగాలు, అంశాలు	Panoramic సర్వదిగ్దర్శక
Eastings ఈస్టింగ్స్	Perspective దృక్పథము
Elevation ఉన్నత	Polar ధ్రువ
Ellipse దీర్ఘవృత్తము	Primary divisions ప్రాథమికాంశాలు
Enlargement వివర్ధనము	Profile పార్శ్వ
Escarpment ఎస్కార్ప్ మెంట్	Projection ప్రక్షేపము
Filled line scale పూరిత రేఖాస్కేల్	„ , homolographic హోమోగ్రాఫిక్ ప్రక్షేపము
Form ఆకృతి	„ , international అంతర్జాతీయ ప్రక్షేపము
Fully divided scale పూర్తి విభజిత స్కేల్	„ , Mercator మర్కేటర్ ప్రక్షేపము
Geological భౌమ	„ , Mollweide మోల్వైడ్ ప్రక్షేపము
Grid గ్రిడ్	„ , polyconic బహుశాంక వీయ ప్రక్షేపము
Guide lines మార్గ దర్శకాలు	
Hachures హెచూర్లు	
Hemisphere అర్ధగోళము	
Hill shading హిల్ షేడింగ్	

కొని

Projection, simple conical సరళ శాంక
 ,, ,, ,, వీయ ప్రక్షేపము
 ,, ,, ,, , simple cylindincal సరళ
 ,, ,, ,, స్తూపాకార ప్రక్షేపము
 ,, ,, ,, sinusoidal సైన్య సోయ్డల
 ,, ,, ,, ప్రక్షేపము

Pseudo అభాస
 Quadrant పాద
 Reduction లఘూకరణము
 Reference నిర్దేశకము
 Relief నిమోన్నత-
 Representation నిరూపణ
 Representative fraction ఉపలక్షక
 భిన్నము
 Reserve forest రక్షితారణ్యము
 Ridge రిడ్జ్
 Relative సాపేక్ష
 Scale స్కేల్
 Secondary divisions ద్వితీయాంశాలు
 Serial సక్రమ
 Sign చిహ్నము

Similar సదూప
 Sine curves సైన్ వక్రాలు
 Spot heights స్థలొన్నతులు
 Smooth curves మృదు వక్రాలు
 Spring tide పర్వవేలా తరంగము
 Spur స్పర్
 Squares గళ్ళు, చతురస్రాలు
 Standard parallel ప్రామాణిక అక్షాంశము
 Statute స్టాట్యూట్
 Strip పట్టి
 Superimposed ఉపరిన్యస్త
 Terminal అగ్రాంతస్థ
 Three dimension త్రిపరిమాణము
 Topography స్థలాకృతి
 Tracing paper ఉల్లిపొర కాగితము
 Transverse తిర్యక్
 Vanishing point అదృశ్య బిందువు
 Vertical ఊర్ధ్వ, లంబ
 Visiblity దృగ్గోచరత
 Weather వాతావరణము
 Zenithal శీర్ష

పారిభాషిక పదకోశము

తెలుగు - ఇంగ్లీషు

అంతర్జాతీయ ప్రక్షేపము

International projection

అంతర్లంబాలు Offsets

అంతర్వేశనము Interpolation

అంశాలు భాగాలు Divisions

అగ్రాంతస్థ Terminal

అట్లాస్ Atlas

అదృశ్యబిందువు Vanishing point

అనుబంధము Appendix

అర్ధగోళము Hemisphere

ఆకృతి Form

ఆధారతలము Datum plane

ఆభాస- Pseudo-

ఈస్టింగ్స్ Eastings

ఉచ్చతాదర్శివర్ణము

Hypsometric colouring

ఉన్నతము Elevation

ఉపరివ్యస్త Superimposed

ఉపలక్షకభిన్నము

Representative fraction

ఊర్ధ్వ- Vertical

ఉల్లిపొర కాగితము Tracing paper

ఎస్కార్ప్మెంట్ Escarpment

ఏకీభవించు Coincide

క్రమరహిత Irregular

క్షితిజసమాంతర Horizontal

గణితీయ Mathematical

గళ్ళు, చతురస్రాలు Squares

గ్రిడ్ Grid

చతురస్రాలు, గళ్ళు Squares

చిత్రము Diagram

చిహ్నము Sign

చేదిత Dissected

డయల్ Dial

తిర్యక్ Transverse

తీరమైదానము Coastal plain

తులనాత్మక స్కేల్ Comparative scale

త్రిపరిమాణము Three dimension

దిక్చక్రము Horizon

దిగంశీయ Azimuthal

దీర్ఘవృత్తము Ellipse

దృక్పథము Perspective

దృగ్గోచరత Visibility

దృష్టిరేఖ Line of sight

ద్వితీయాంశాలు Secondary divisions

ధ్రువ Polar

నాటికల్ Nautical

నార్టింగ్స్ Northings

నిమోన్నత-Relief

నిరూపణ Representation

నిరేశకము Reference

నిర్దిశాంశాలు Coordinates

పటమాపకము Opisometer

పట్టీ Strip

పర్వవేలాతరంగము Spring tide

పాద Quadrant

పార్శ్వ Profile

పూరితరేఖాస్కేల్ Filled line scale

పూర్తివిభజితస్కేల్ Fully divided scale

పొర Layer

ప్రక్షేపము Projection

ప్రాథమికాంశాలు Primary divisions

ప్రామాణిక-అక్షాంశము

Standard parallel

ప్రయోగదీపిక Lab manual

బెంచ్ గుర్తు Bench mark

బహుళ Multiple

బహుళాంకవీయప్రక్షేపము

Polyconic projection

భాగాలు, అంశాలు Divisions

భూదృశ్యము Landscape

భృగువు Cliff

భౌమ Geological

బ్లాక్ చిత్రము Block diagram

మధ్యరేఖాంశము Central meridian

మధ్యాంతరము Interval

మరుగుభూమి Dead ground

మర్కేటర్ ప్రక్షేపము

Mercator projection

కా:

మానచిత్రము Map

మాపకపకాంకము Measuring unit

మార్గదర్శకాలు Guide lines

మాలిన్ ప్రక్షేపము

Mollweide projection

మిలిటరీఆపరేషన్ Military operation

మూల, మౌలిక Original

మృదువక్రాలు Smooth curves

మొరైన్ Moraine

మౌలిక, మూల Original

యథాకృతిక Orthomorphic

రక్షితారణ్యము Reserve forest

రిడ్జ్ Ridge

లఘూకరణము Reduction

లేఖనపద్ధతి Method of drawing

విచ్ఛిన్న Interrupted

వివర్ధనము Enlargement

వివృతవిభాజితస్కేల్ Open divided scale

వాతావరణము Weather

వైశాల్యము Area

శాంకపీయ Conic, conical

శీర్ష Zenital

సంయుక్త Composite

సక్రమ Serial

సదృశ Conformal

సమోన్నతరేఖలు Contour li

సరళశాంకపీయప్రక్షేపము

Simple conical

సరళస్తూపాకారప్రక్షేపము

Simple cylindrical

సమాప Similar

సర్వదిగ్దర్శక Panoramic

సెలయేరు Cascade

సైన్ వక్రాలు Sine curves

సైన్యసోయెడల్ ప్రక్షేపము

Sinusoidal

సాంప్రదాయక Convention

సాపేక్ష Relative

స్కేల్ Scale

స్టాట్యూట్ Statute

స్తూపాకార Cylindrical

స్థలాకృతి Topography

స్థలోన్నతులు Spot heights

స్పర్ Spur

హిమగర్తము Cirque

హిల్ షేడింగ్ Hill shading

హాషూర్లు Hachures

హోమోలోగ్రాఫిక్ ప్రక్షేపము

Homolograph